

117. *Bokula*, Isangi, Stanleyville (Congo), dans les tiges creuses de *Plectronia Laurenti* et de *Cuvieria angolensis*.

Var. **Zeta** n. var. — ♀. — Identique de sculpture et de taille à la subsp. *Laurenti*, mais les funicules sont bruns au lieu d'avoir la deuxième moitié jaune comme chez le type de l'espèce et de la sous-espèce. Les épines sont aussi un peu plus longues.

Congo dans les tiges creuses d'une plante.

**Cremastogaster Kohli** n. sp. — ♀. — Long. 2,5 à 2,7 mill. — Très semblable à l'*inconspicua* MAYR., dont il a l'échancrure thoracique formant un enfoncement anguleux et médian de tout le thorax, ainsi que la forme du pédicule, avec le deuxième nœud profondément échancré derrière, mais sans sillon devant. Par contre, il en diffère par sa taille plus petite et plus ramassée, par son scape qui ne dépasse pas ou dépasse à peine le bord postérieur, par son mésonotum plat qui a une éminence médiane longitudinale devant (convexe, mais sans éminence ni carène chez *inconspicua*). Le pronotum est aussi abrupt devant; subhorizontal derrière, un peu subbordé et subépaulé devant en haut; tandis qu'il est arrondi chez l'*inconspicua*.

Luisant, très finement et faiblement chagriné, avec des points épars. Thorax moins luisant, très finement ridé en long. Pilosité dressée presque nulle. Pubescence assez diluée, plus abondante sur les tibias et les scapes qui n'ont pas de poils dressés.

Très noir. Pattes et scapes d'un brun foncé. Mandibules, funicules et tarses d'un rouge brunâtre assez foncé. Les épines sont longues comme la moitié de leur intervalle et assez pointues. La tête est échancrée derrière, plus large que longue.

Ressemble au premier abord à l'*africana*, r. *Laurenti*, dont il diffère surtout par l'enfoncement du thorax qui le rapproche de l'*inconspicua*.

Stanleyville (KOHL).

### VIII. — Fourmis du Congo

récoltées par MM. LUJA et KOHL et reçues de M. WASMANN.

*Dorylus (Anomma) Wilwerthi* EMERY. — ♂ et ♀. — Récoltés ensemble dans une même armée d'*Anomma* en août 1907 par M. LUJA à Sankuru, Kassai, Congo belge. Cette trouvaille confirme absolument ce que j'ai dit plus haut; le ♂ correspond bien à celui que j'ai décrit ci-dessus comme ♂ de l'*A. Wilwerthi*. Le ♂ de cette espèce a aussi été récolté par M. KOHL à St-Gabriel près Stanleyville.

*Dorylus (Anomma) nigricans* ILLIGER v. *funerea* EM. — ♂. — Sankuru, Kassai, Congo belge (LUJA).