

Dorylus (Rhogmus) fimbriatus SHUCK. — ♂. — Sankuru (LUJA).

Dorylus depilis EMERY. — ♂. — Sankuru (LUJA).

Dorylus moestus EMERY. — ♂. — Sankuru (LUJA).

Cataulacus princeps EMERY. — ♀. — Sankuru (LUJA).

Triglyphothrix mucidus n. sp. — ♀. — Long. 3,4 mill. — Très voisin de *gabonensis* ANDRÉ, dont il diffère comme suit : Mandibules assez densément striées-ridées, sauf à l'extrémité. Epistome bien plus largement échancré au milieu de son bord antérieur. Tête bien plus distinctement concave derrière, avec les angles postérieurs moins arrondis. Le scrobe pour les scapes est plus profond, plus distinctement bordé derrière, formant de côté une faible dépression pour les funicules. Les yeux sont ovales et convexes, ne formant pas de pointe en avant et en bas. Thorax plus large, moins convexe transversalement, surtout le pronotum. Epines à peine aussi longues que leur intervalle (plus longue que lui chez le *gabonensis*). Pétiole antérieur du premier nœud un peu plus court que le nœud (plus long chez le *gabonensis*).

Tête, thorax et pédicule mats, assez grossièrement et densément ridés-réticulés longitudinalement et en outre finement réticulés. Abdomen et membres lisses et luisants avec une ponctuation fine et espacée.

Tout le corps, les pattes et les antennes densément recouverts d'une longue pilosité blanchâtre, laineuse et polyfide qui leur donne l'air d'être couverts de moisissure. Cette pilosité est bien plus longue, bien plus dense et bien plus polyfide que chez le *gabonensis*. Un seul poil peut se diviser en six, huit et même plus de branches, partout, même sur les tarse; sur le corps, chaque poil forme une mèche polyfide.

D'un brun noirâtre; pédicule plus clair. Pattes, antennes, mandibules, épistome et arêtes frontales roussâtres.

Sankuru, Kassai, Congo belge (LUJA). Cette curieuse espèce est bien distincte de *gabonensis* ANDRÉ, sa voisine, par sa forte sculpture mate, par sa pilosité dense et polyfide qui surenchérit sur celle de toutes les espèces du genre, enfin par la forme de la tête, du scrobe, etc.

Tetramorium aculeatum MAYR v. *Wasmanni* FOREL — ♀, ♀, ♂. — Sankuru (Luja). — Mon *Wasmanni* n'est qu'une petite variété de l'*aculeatum* avec des épines plus courtes. Chez la femelle, les épines sont aussi plus courtes.

Cremastogaster Kohli n. sp. — ♀. — Station de Romé près Stanleyville (KOHLE). Voir la description plus haut.