

19. *DOLICHODERUS BITUBERCULATUS* Mayr ♀
LUZON, Manila, P. I. (4490 *W. Schultze*).
20. *DOLICHODERUS PATENS* Mayr subsp. *PUBIVENTRIS* Emery ♀ ♀
PALAWAN, Iwahig, P. I. (8897 *F. W. Foxworthy*).
Cette forme constitue, plus ou moins, un intermédiaire entre *patens* Mayr, dont elle a la sculpture, et *semirugosus* Mayr, dont elle a la couleur; mais l'abdomen est plus pubescent que chez tous les deux.
21. *PRENOLEPIS LONGICORNIS* Latr. ♀ ♀
Cosmopolite. LUZON, Manila, P. I. (2890 *Banks*).
22. *PLAGIOLEPIS LONGIPES* Jerdon ♀.
NEGROS OCCIDENTAL, Pinayañ, Bago, P. I. (6907 *Banks*).
23. *CAMPONOTUS (COLOBOPSIS) VITREUS* Smith ♀ ♀.
LUZON, Province of Zambales, Olongapo, P. I. (12860 *Banks*).
24. *CAMPONOTUS (COLOBOPSIS) PUBESCENTS* Mayr ♀
LUZON, Province of Lepanto-Bontoc, Cervantes, P. I. (8790 *Banks*).
25. *CAMPONOTUS MACULATUS* Fabr. subsp. *PALLIDUS* Sm. ♀
LUZON, Manila, P. I. (2579 *Banks*).
26. *CAMPONOTUS MACULATUS* Fabr. subsp. *SUBNUDUS* Em. ♀ ♀
LUZON, Manila P. I. (2506 *W. Schultze*).
27. *CAMPONOTUS QUADRISECTUS* Sm. ♀
LUZON, Province of La Laguna, Santa Maria, P. I. (8606 *H. M. Curran*).
28. *Camponotus horrens* sp. nov.
♀ Long. 5.5 mill. Mandibules lisses, luisantes, étroites, armées de 5 dents; l'angle entre le bord interne et le bord terminal très obtus. Epistome très convexe, subcaréné au milieu, à bord antérieur biéchancré, sublobé entre les échancrures, faiblement imprimé au milieu dudit bord antérieur. Aire frontale bien plus large que longue, mal délimitée en arrière. Sillon frontal remplacé par une carène longitudinale assez courte. Arêtes frontales plutôt courtes, très divergentes. Tête large, fort convexe, trapéziforme, à côtés convexes, fortement rétrécie devant, au moins aussi large derrière que longue, à bord postérieur presque droit. Yeux convexes, situés au quart postérieur de la tête. Le scape dépasse le bord occipital des 2/5 à la moitié de sa longueur. Thorax conformé comme chez le *C. sexguttatus* Fabr., mais encore plus profondément échancré entre le mésonotum et l'épinotum. Ce dernier forme une bosse allongée, dont l'extrémité antérieure, arrondie en haut, tombe en haute marche d'escalier sur la suture méso-épinotale. Vue de dessus cette bosse est subdéprimée, plus longue que large, mais à peine plus étroite que le mésonotum; face déclive mal délimitée, plus courte que la face basale.