

possède de différentes provenances, entre autres l'ouvrière de Dongarra de l'Australie du Sud-Ouest (Expédition hambourgeoise). Je crois être certain qu'un mâle d'une localité voisine, Gooseberry Hill, provenant de la même expédition, appartient à *barbigula*; il est encore inédit :

*Aphaenogaster* (*Deromyrma*) *barbigula* Wh. ♂ L: 7,8 mm.; longueur d'une aile, 8 mm. Mandibules triangulaires avec une forte dent devant et des denticules irréguliers derrière (quelques-uns plus distincts), luisantes, un peu striées à la base. Les yeux sont grands, situés au tiers antérieur. Tête environ aussi large que longue. Le très grand mésonotum surplombe l'occiput; il est deux fois plus large que la tête. Le scutellum, très grand aussi, plus large que long, surplombe un peu derrière le post-scutellum. L'épinotum forme une seule surface presque plane, à peine convexe, mais descendant obliquement d'avant en arrière jusqu'au pétiole (l'épinotum est divisé en deux portions par un angle concave chez le *longiceps* et le *Pythia*). Le pétiole et le post-pétiole sont plus élevés que chez les deux autres espèces. Lisse et luisant. Quelques rides grossières, longitudinales sur le derrière de la tête et devant les yeux, obliques sur les côtés de l'occiput et sur l'épinotum.

La pilosité est semblable à celle de l'ouvrière, en particulier les longs poils de barbe qui sont très nombreux sous la tête. Mandibules, funicules, scapes et pattes d'un jaune roussâtre, ainsi que le bord postérieur des segments abdominaux. Milieu des cuisses, abdomen et pétiole brunâtres, le reste de la tête et le thorax d'un brun noirâtre. Ailes enfumées de brunâtre.

Gooseberry Hill, Australie occidentale (Expédition hambourgeoise de 1905.)

Dans le journal « *Psyche* », vol. XXIII, n° 2, p. 40, 1916, M. Wheeler croit devoir changer le nom de *Pheidole*