

d'affaire, de baser des sous-genres sur des caractères peu sûrs, surtout là où nos observations sont encore incomplètes. Mais pour un genre paléarctique aussi connu que le genre *Lasius*, cela n'a plus guère de raison d'être.

*Camponotus (Myrmotherix) Balzani* Em. ♀ (Musée de Zurich). Prov. Espirito Santo. Ex. Coll. Fruhstorfer.

Mon cher collègue, le Dr Santschi, m'a rappelé une notice complètement oubliée par moi dans mon livre sur les fourmis de Madagascar d'Alfred Grandidier (« Histoire de Madagascar, vol. XX, 2me partie, 1891, p. 213). J'avais alors donné en deux mots le nom de *radamoïdes* à une variété du *Camponotus maculatus* de la forêt d'Andrangoloaka, récoltée par M. Sikora, variété qui se trouve être très analogue à celle que j'avais appelée plus tard *r. atramentarius*. Il s'ensuit, bien à mon contre-cœur, que le nom de *radamoïdes* doit, pour la race, être substitué à celui d'*atramentarius*. Néanmoins, le *radamoïdes*, que je suis parvenu à retrouver dans ma collection, n'est pas identique à mon type de l'*atramentarius*. Il est avant tout plus grêle, plus allongé, avec les membres plus longs. L'*atramentarius* a la tête plus large, presque noire ; tout le thorax est presque noir sur le dos. Donc l'*atramentarius* doit demeurer, au moins comme variété, distincte du *radamoïdes*. En outre, dans la liste des variétés du *radamoïdes*, Santschi a oublié la grande variété africaine que j'ai appelée *cluis*.

Comme, en 1911, Emery et moi, nous avons nommé *rufiventris*, lui une variété de la *Polyrhachis (Myrmatopa) Alpheus*, et moi une variété de la *Polyrhachis (Myrmhopla) Gestroi*, je me permets de rebaptiser la mienne du nom de *moeschiella* n. v., pour éviter des confusions (du nom de M. Moesch qui l'a trouvée).

Dans le « Bulletin de la Société entomologique de France », année 1916, n° 15, p. 243, M. Santschi déclare la *Polyrharchis (Chariomyrma) hostilis* Sm. v. *hirsutulata*