

son tiers antérieur est très obtusément subtronqué. Les arêtes frontales, faiblement divergentes, sont bien plus éloignées l'une de l'autre que du bord de la tête. Les yeux convexes sont situés en avant du tiers antérieur. Le sillon occipital atteint le milieu de la tête; ce dernier a, de côté, une large impression pour l'extrémité du scape. Antennes de douze articles. Le scape dépasse à peine le milieu de la tête. Le dernier article de la massue est long comme environ les deux précédents réunis. Le promésotum forme une forte convexité, aussi haute que longue, avec deux tubercules pronotaux indistincts. *A son milieu, le mésotum porte deux fortes dents triangulaires, pointues et très distinctes, dirigées en arrière.* L'épinotum, horizontal, à peu près carré, porte deux très longues épines, un peu divergentes, dirigées en haut et un peu en arrière, au moins aussi longues que sa face basale et plus longues que la face déclive. Le pétiole, sans dents dessous, a un pédicule antérieur plus long que son nœud, qui est comprimé, avec un bord supérieur très obtus. Le postpétiole est presque trois fois plus large que le pétiole et presque deux fois et demie plus large que long, formant de chaque côté un cône pointu. Pattes courtes; cuisses renflées au milieu.

Tête subopaque, presque mate, très finement réticulée, ridée en long sur plus de sa moitié antérieure (sauf à l'impression pour les scapes), grossièrement réticulée sur son bon tiers postérieur.

Thorax assez luisant, en partie finement et de plus grossièrement et irrégulièrement réticulé et ridé. Pétiole, postpétiole et base de l'abdomen subopaques et finement réticulés, le postpétiole plus faiblement. Reste de l'abdomen lisse et luisant, ainsi que les pattes.

Pilosité dressée, espacée, pointue, mais fort distincte, sur tout le corps et tous les membres. Pubescence presque nulle. D'un brun assez foncé; mandibules d'un brun un