

peu roussâtre avec le bord noir. Abdomen et membres d'un brun jaunâtre.

♂ L : 1,4-1,8 mill. Mandibules subopaques, finement réticulées et ponctuées, faiblement dentées. Bord antérieur de l'épistome entier. Tête à côtés convexes ; elle est presque aussi large au milieu que longue, rétrécie devant et derrière, avec le bord postérieur échancré. Les yeux sont situés au milieu des côtés, et sont assez convexes. Le scape dépasse le bord postérieur de deux fois son épaisseur. Promésonotum fort convexe. *Le mésonotum porte au milieu deux dents pointues et divergentes, plus longues que larges et encore plus distinctes que chez le ♀* Epines de l'épinotum comme chez le ♀, aussi longues que la face basale et un peu recourbées en avant. Postpétiole aussi long que large, à côtés convexes, sans trace de cône latéral, à peine deux fois plus large que le pétiole. Cuisses renflées au milieu.

Tête et thorax densément réticulés et mats. Pétiole, postpétiole, abdomen et membres lisses et luisants. Pilosité et pubescence comme chez le ♀. Entièrement d'un roux jaunâtre, abdomen et pattes jaunâtres.

♀ L : 3,6 mill. Mandibules comme chez le ♀. Tête carrée, faiblement et largement échancrée à son bord postérieur, sans impression derrière, non subtronquée. Ocelle antérieur plus gros que les autres. Le scape atteint le quart postérieur. Le mésonotum, aplati dessus, n'est pas plus large que la tête et n'a, de côté, qu'une dent obtuse et peu distincte. Abdomen tronqué devant (comme du reste chez le ♀). Tout le reste comme chez le ♀, mais l'occiput seul est grossièrement réticulé, le devant de l'abdomen est mat, densément réticulé et le dos du mésonotum est grossièrement ridé en long, le scutellum étant lisse. Le corps entier est d'un brun noirâtre, y compris l'abdomen. Les pattes sont brunes, avec les articulations, les tarses et les antennes, roussâtres ; devant de