

Solenopsis (Synsolenopsis ?) Bruchi n. sp. ♀ L : 3,9-4,4 mill. Bien plus petite que *Weiseri*. Les ailes, entièrement hyalines, ne dépassent pas l'abdomen. Les mandibules, subopaques et ridées, sont plus courtes et plus obtuses que chez *Weiseri*, tridentées à l'extrémité ; leur bord terminal est droit, pas oblique. Deux dents pointues à l'épistome, comme chez *Weiseri*. ; mais les arêtes frontales sont plus rapprochées l'une de l'autre, plus aiguës et formant entre elles un sillon luisant et étroit, plus long et plus marqué. L'épinothum a deux dents pointues fort distinctes derrière, fait tout à fait exceptionnel pour un *Solenopsis*. Le nœud du pétiote est beaucoup plus bas et plus conique que chez *Weiseri*. Le postpétiote est aussi plus bas ; mais les dents en bas sont les mêmes. La couleur est noire, avec les pattes et les antennes brunes, les articulations, les mandibules et les arêtes frontales d'un roux jaunâtre. Tout le reste à peu près comme chez la *L. tenuis* r. *Weiseri*, mais le thorax est relativement plus étroit.

Canals, Cordoba, récolté par M. Weiser, avec le *Solenopsis tenuis* r. *Weiseri* ♀ et ♂.

Karawaiew ayant décrit en 1909 (Horae soc. ent. rossicae XXXIX, nov. 1909, p. 272) sous le nom de *rufa* une variété du *Messor barbarus* L. R. *méridionalis* André, la variété *rufa* du *Messor barbarus* r. *semirufus* André que j'ai décrite, sans m'apercevoir de la chose, dans mes « Ameisen aus Erythraea » dans les « Zoologischen Jahrbüchern vol. XXIX, 1910, p. 250, doit changer de nom ; je la nomme var. **rufula** nov. nom.
