

Stanleyville (Congo), récoltée par le Père Hermann Kohl. Un seul exemplaire. Si je me permets de décrire cette espèce sur une ♀ seule, c'est que chez les *Myrmamblys* et les *Colobopsis* la tête est très caractéristique et que cette espèce est bien plus grande que tous les *Myrmamblys* africains à moi connus. Elle se rapproche un peu du *Buchholzi* Mayr.

M. H. Kohl a encore récolté à Stanleyville deux femelles de *Strumigenys*, dont l'une me paraît être une variété du *S. (Cephaloxys) Lujae* For. et l'autre une race ou variété du *S. (Cephaloxys) Escherichi* For. Mais ici il faudrait avoir les ouvrières pour décider, et je préfère me taire.

\* \* \*

Il y a précisément cinquante ans que je publiais, en 1869, mon premier travail sur les fourmis : « Observations sur les mœurs du *Solenopsis fugax*, dans les « Mitteilungen der schweizerischen entomologischen Gesellschaft ». Le glaucome dont mes yeux sont atteints m'empêche aujourd'hui presque entièrement de continuer mes descriptions de fourmis. Mais le présent petit travail étant le 231<sup>e</sup> que j'écris sur mes vieilles petites amies, le moment est venu de m'arrêter bientôt.

---