

*Formica exsecta* Nyl. ♀♀. Одно гнѣздо было найдено около основанія горы;—обычнаго типа.

*F. (Rapiformica) sanguinea* Ltr. Этотъ рабовладѣльческій муравей гнѣзвился въ гнилыхъ пняхъ и частью подъ камнями вмѣстѣ съ *F. fusca* L.

*F. (Serviformica) fusca* L. Обыкновененъ, въ старыхъ полу-сгнившихъ пняхъ березы.

*F. (Serviformica) fusca picca* Nyl. Встрѣтилъ рабочихъ, бѣгавшихъ по землѣ и по камнямъ. Гнѣздились въ землѣ, въ норахъ.

*F. (Serviformica) rufibarbis* F. Найдено гнѣздо подъ камнемъ.

*F. (Serviformica) rufibarbis subpilosa* Ruz. Найдено нѣсколько ♀♀ при самомъ основаніи Волгиной Горы; бѣгали по влажной песчанистой почвѣ недалеко отъ берега рѣки.

*Lasius niger* L. Обыкновененъ и въ средней части горы и при основаніи ея.

*Las. n. alienus* (Foerst) и *v. alieno-niger*. Встрѣчены у вершины горы подъ камнями, также ползавшими на шиповникѣ.

*Las. (Chthonolasius) mixtus* Nyl. Былъ обыкновененъ; гнѣзвился подъ камнями и въ земляныхъ холмикахъ.

*Las. (Chthonolasius) umbratus* Nyl. Найдено только одинъ экземпляръ рабочаго у вершины горы.

*Las. (Chthon.) flavus* DG. Гнѣзвился въ земляномъ холмикѣ на нижнемъ склонѣ горы.

*Las. (Chthon.) flavus tyops* For. Гнѣзвился подъ мхомъ близъ вершины горы.

*Tetramorium caespitum* L. n. var. (свѣтлый, буровато-коричневый, слабо блестящій). Гнѣзвился подъ камнями на склонѣ и у вершины горы.

*Myrmica ruginodis* Nyl. самцы и ♀ (10/VIII). Мирмика эта была встрѣчена нѣсколько разъ; гнѣздилась въ гнилыхъ пняхъ и обнявъ разъ подъ камнемъ.

*Myrm. sulcinodis* Nyl. ♀♀. Найдены были лишь отдѣльные экземпляры, ползавшіе по землѣ.

*Myrm. scabr. lobicornis* Nyl. Гнѣздились подъ камнями.

*L. (Mychothorax) acervorum* (Fabr.), жили подъ мхомъ и подъ корой березовыхъ пней.

*L. (Mychothor.) acervorum* (Fabr.), var. *superus* Ruz. Одинъ экз. рабочаго ползалъ по скалѣ у вершины горы.