

Poa attenuata
Balamagrostis epigeios
Festuca ovina
Alopecurus ventricosus
Stipa capillata
Glycyrrhiza uralensis
Artemisia glauca
Artem. scoparia
Artem. sacrorum
Artem. frigida
Iris flavissima (?)
Allium Stellerianum
Chenopodium cristatum
Silene Otites
Dianthes Seguieri
Pulsatilla patens

Alyssum alpestre
Spiraea hypericifolia
Potentilla tanacetifolia
Potent. viscosa
Vicia amoena
Onobrychis sativa
Vincetoxicum sibiricum
Thymus serpyllum
Veronica spicata
Scabiosa ochroleuca
Aster altaicus
Senecio jacobaea

Особенно много было *Aster altaicus* Welld., который своими цветами оживлял степь.

Въ основномъ бору крѣвъ *Spiraea crenifolia* С. А. Мей. на песчаныхъ осыпавшихся буграхъ росъ высокій злакъ *Ееуmусъ sabulosus* М. а Bieb. и *Coloneaster vulgaris* Lindl. съ черными плодами.

Изъ муравьекъ въ бору были обыкновенны: *Formica r. pratensis* Retz., *Campon. herc. japonicus* Mayr. и *Tetramorium caespitum* L. (тип. и var.); послѣдній, впрочемъ, на степи былъ еще обыкновеннѣе. Также въ бору и на степи попадался желтый ласиусъ въ двухъ формахъ (*Chthonolasius mixtus* Nyl., *Chthon. umbratus affinis* Schnk). Оба эти муравья, т. е. тетрамоориумъ и ласиусы, жили на степи при довольно разныхъ условіяхъ; такъ, наприм., тетрамоориумъ гнѣздилися нерѣдко подъ старымъ, сухимъ коровникъ пометомъ, а муравейникъ ласиуса (*Chthon. mixtus*) я нашель разъ въ лошадиномъ черепѣ, наполовину уже закопанномъ въ песокъ работой самихъ ласиусовъ.

Кромѣ указанныхъ муравьевъ мною въ этой мѣстности найдены еще: *Formica rufibarbis* F., *Form. f. picea orientalis* Ruz., *Form. rufibarbis*, var. *glauca* Ruz., *Form. cinerea imitans* Ruz., *Form. f. glebaria* Nyl., *Lasius alienus* (Foerat.), *Leptothorax tuberculatus* (Ltr.), *Leptoth. nassonovi* Ruz., *Myrmica scabrinodis*