

Въ Минусинскомъ музѣи имѣются экземпляры этого тритона изъ рѣчки Нички и р. Лугавки (3 экз. 1878 и 1888 г.).

2. *Bufo vulgaris* Laur. Сѣрал жаба очень обыкновенна по-всюду, кроме сосняковъ боровъ и сухихъ степей. Найдена мной между прочимъ на горѣ Самохвалъ, противъ Тагарского острова.

3. *Rana temporaria* Lin. (*Rana tuta* Laur.). Травяная лягушка найдена на лугахъ въ верховьяхъ р. Минусинки и въ Лугавскомъ бору на небольшомъ болотѣ, затѣмъ около с. Новоселова и у озера Карасинъ къ В. отъ Минусинска.

4. *Rana arvalis* Nils. Обыкновенна по сырьимъ лугамъ долинъ рѣкъ и бѣръ. Въ долинѣ нижней Тубы, на островахъ при ее устьѣ, также на Тагарскомъ островѣ противъ Минусинской островородной лягушки наблюдалась мной въ изобиліи. Молодые экземпляры, пойманные въ долинѣ р. Минусинки (13 августа) и на Тагарскомъ островѣ (16 авг.) достигали въ длину тѣла отъ 2,3 до 2,9 см. Найдена и около Мажарскихъ бѣръ и у Тиберкуля.

5. *Typhidonotus natrix* Lin. Уже обыкновенный въ Минусинскомъ уѣздѣ переходить границу р. Енисея ¹⁾ и встречается на востокѣ отъ него въ долинѣ нижняго и средняго теченія р. Тубы (наприм. фколо с. Шелаболина и дер. Листвягово). Обыкновенъ на Тагарскомъ островѣ и на островахъ Енисея противъ д. Кривинской, на лугахъ у с. Шушенского, также при устьѣ р. Абакана. На лѣвомъ берегу Енисея найденъ мной при основаніи Волгиной горы.

Въ Минусинскомъ музѣи имѣются экземпляры *Tropidon. natr.* изъ долины рѣчки Аши (1 экз. 1900 г.) и съ горы Майдаша (2 экз. 1887 г.) ок. Майдашинской замкѣи.

6. Узорчатый скрытый ужъ или полозъ (*Coluber dione* Pall.) былъ пойманъ мной въ нѣсколькихъ экземплярахъ на каменистомъ склонѣ на Тагарскомъ островѣ и на горѣ Самохвалъ. Змѣя эта держится среди холмистой степи и по невысокимъ горамъ преимущественно на каменистыхъ хъстахъ и около выходовъ скалъ, въ щеляхъ между которыми она прокладываетъ себѣ норы. Встрѣчается и на ровной стени, но гораздо реже (д. Иня).

1) Проф. А. М. Ильинъ въ своемъ «Определителе просыпающихся ящерицъ Россійской Имперіи», Харьковъ, 1907 г., на стр. 102 указываетъ, что восточная граница обыкновенного ужа изъ Сибири служить р. Енисея. Но въъзять его въ Иргутскому музею и добыть одинъ экземпляръ въ окрестностяхъ с. Листвянкичного на Байдарахъ.