

Этот кампонотус, распространенный в Туркестане и Закаспийской области, кроме своих обычных муравейников в земле и под камнями, живет также и в гнездах термитов (*Nodotermes angherinus*), как это уже наблюдал г. Васильев в Красноводском уезде Закаспийской области.

2. *C. (Murgoturba) maculatus casium* For.

Распространен в Северной Африке и в Персии.

В Закаспийской области найден впервые В. А. Караваевым. ²⁾

3. *C. (Murgoturba) maculatus xerxes* For.

Я считал этого кампонотуса раньше за *C. maculatus compressus* (Fabr). Но теперь для меня ясно, что это самостоятельная раса т. е. именно *xerxes* For.

Раньше был добыт с остр. Челекена проф. А. Штуценбергом (см. М. Рузский, Муравьи России, ч. 1-я, стр. 208).

4. *C. (Murgoturba), maculatus fedtshenkoi* Mayr, var. *obliquipilosa* For.

Найдены рабочие в барханных песках острова. Раньше был известен из Закаспийской области.

5. *C. (Murgoturba) maculatus fedtshenkoi* Mayr, var. *nuda* nov. var.

Два экземпляра рабочих (minor), имеющиеся в коллекции, отличаются отсутствием наклонностоящих волосков на щеках головы; без прилегающих волосков на всем теле и без пунктира на голове.

6. *C. (Murgoturba) maculatus turkestanicus* Emery.

В коллекции имеется один экз. рабочего. Распространен в Закаспийск. обл. и в Туркестане.

7. *Camponotus (Orthonotomurgex) Ashmead) lateralis interjectus* Mayr.

Распространен в Туркестане, в Закаспийск. обл. и на Кавказе (Дегестан). Найден и на Памире.

В коллекции с о. Челекена имеются рабочие и крыл. самки (взяты из гнезда, под камнем 6.VI. 1920).

8. *Murmecocystus foreli* Ruzsky.

Черный фазончик на Челекене найден на глинистой солонцеватой степи.

Распространен во всей Закаспийской области, Бухаре и сев. Персии.

9. *Murmecocystus pallidus* Mayr.

Бледный пещачный бегунёк распространен в Туркестане, в Закаспийской области и в Киргизской степи.

Характерен для сыпучих барханных песков.

10. *Murmecocystus cursor aenescens* Nyl.

Отличается обширным распространением (юго-восток Европы, Закаспийск. обл., Туркестан, Центральная Азия). На Челекене найдены самки и рабочие, в гнезде среди песков (14.VII 09).

11. *Murmecocystus cursor jakobsoni* Ruzsky.

Распространен в Туркестане и в Закаспийской области.

Характерен для глинистой степи.

12. *Murmecocystus bicolor setipes*, var. *turcomanica* Emery.

Красный фазончик обыкновенен на о. Челекене.

Распространен в степях Туркестана и Арало-Каспийской области. Найден также мной и в Закавказьи.

²⁾ W. Karawaew, Ameisen Transkaspien und Turkestan. Труды Русск. Энтомолог. Общ., т. XXXI, 1909 г..