

13. *Acantholepis frauenfeldi* Mayr., var. *arnoldovi* Ruzsky.

До сих пор разновидность эта была известна только из одного пункта в Закаспийской области (Казанджик).

14. *Acantholepis frauenfeldi* Mayr., var. *syriaca* André.

Это новая для России форма. Описана была Э. Андрэ из Сирии.

В коллекции из о. Челекена имеются два рабочих (живет в каменистых местах).

15. *Tarionoma erraticum nigerrimum* Nyl.

Типичная средиземноморская форма. У нас распространена в Туркестане, Арало-Каспийской низменности, на Кавказе и в юго-восточной России.

16. *Plagiolepis rugmaea* Latr.

Широко распространенный, свойственный всей средиземно-морской области вид. У нас населяет Туркестан, Арало-Каспийскую низменность, Кавказ, Крым, юго-восточную часть Европ. России, доходя на север до г. Саратова.

Характерен для глинистой, солончаковой степи; живет также и на каменистой степи.

17. *Plagiolepis rugmaea* Latr., var. *pallascens* For.

Разновидность эта известна из Греции и северной Африки. Мною раньше найдена на Кавказе и в Киргизской степи. На остр. Челекене обыкновенна.

18. *Bothriomyrmex meridionalis* Roger.

В коллекции из Челекена нашлись два экз. рабочих и одна крылат. самка этого маленького муравья, распространенного во всей южной и отчасти средней Европе, также в северной Африке, Малой Азии, Персии и на Кавказе. Известен также и из Туркестана.

19. *Gremastogaster subdentata* Mayr.

Найдены крылатые самки и самцы этого вида около местечка Карагеля в южной части острова.

Распространен в Закаспийской области, Туркестане, Тибете и Китае.

20. *Solenopsis deserticola* Ruzsky.

В коллекции имеется только одна безкрылая самка. До сих пор известен был из Туркестана (Голодная степь).

21. *Tetramorium caespitum* (Lin).

Луговой муравей несомненно обыкновенен на Челекене, судя по большому числу экземпляров рабочих его, добытых там.

Вид палеарктический, широко распространенный. Найден также и в Северной Америке, куда повидимому завезен был из Европы.

22. *Tetramorium caespitum reticuliventre* Ruzsky.

В коллекции имеются только рабочие этой расы, распространенной в пустынях Туркестана, в Закаспийской обл. и в восточном Закавказьи.

23. *Tetramorium striativentre*. Mayr.

Добыты на острове рабочие и безкр. самка.

Вид этот свойствен Туркестану, Закаспийской области и Киргизской степи. Живет в пустынно-каменистых местах.

24. *Strongylognathus hüberti* Ruzskyi Emery.

Найдены два рабочих в юго-восточной части острова, на глинистой степи.

Раньше был найден мной в Киргизской степи, в Индерских горах (Уральская область).