

25. *Leptothorax satunini* Ruzsky, subsp. *fumosus* (nov. subsp).

В коллекции с остр. Челекена имеются только рабочие этой расы.

Отличается от типичного вида главным образом скульптурой поверхности тела и цветом.

Голова, ноги и стебельки совершенно гладкие и блестящие; на боках груди и обоих члеников стебелька имеются продольные морщинки, довольно крупные, промежутки между которыми покрыты тонкой нежной сетчатостью. Поверхности заднеспинки между зубчиками гладкая и блестящая. Зубчики на заднеспинке более крупные и острые.

Цвет всего тела более темный, дымчато-буроватый с темно-коричневыми верхом головы, пятном на pronotum и на всей верхней поверхности брюшка.

Булава усиков и ножки темно-коричневые. Сочленения ножек и лапки желтые. Дл. тела 2, 3—3 мм.

Типичный вид был известен из Закавказья и из Бухары. Живет в глинисто-солончаковой, полынной пустыне, среди зарослей тамариска.

26. *Leptothorax semenovi* Ruzsky.

В коллекции с остр. Челекена найден один экземпляр рабочего муравья, взятый на глинистой степи в СВ-ной части острова. Это очень интересная находка, так как до сих пор этот муравей был известен только из Киргизской степи, где он был найден мною на горе Малое Богдо, и еще в одном пункте Закаспийской области.

27. *Monomorium gracillimum* (Smith)

Два экземпляра рабочих этого вида были взяты на песчаной косе Ю.-З-ной части острова. Вполне типичны.

Распространен этот вид в северо-восточной Африке, Аравии, Сирии, Персии и на острове Цейлоне. Волится и у нас в Закаспийской области.

28. *Monomorium barbaticum* Mayr.

Этот характерный для Арало-Каспийской пустыни вид, должен быть очень обыкновенен на Челекене, судя по большому количеству полученных мною экземпляров рабочих его и самок.

29. *Pheidole pallidula* Nyl., var. *arenarum* Ruzsky.

Добыт один рабочий во дворе дома в с. Карагель, в южной части острова.

Разновидность эта свойственна Закаспийской области и Туркестану. Живет на глинисто-песчаной степи.

30. *Messor excursionis* Ruzsky.

Рабочие этого муравья найдены в двух пунктах в юго-восточной части острова. Распространен в Закаспийской области и в Туркестане, доходя на восток до озера Балхаша. Живет в песках, среди барханов.

У крупных рабочих (major) этого вида, находящихся у меня с остр. Челекена, на личном щитке имеется небольшая выемка посередине переднего края. Ножки и усики с частыми, наклонно стоящими волосками.

Помещаю здесь рисунок профиля заднеспинки этого муравья.

См. рис. № 1-й.

31. *Messor barbarus capitatus* (Latr.), var. *aralocaspiæ* Ruzsky.

Характерен для Закаспийской области. На о. Челекене добыты рабочие и безир. самки (на глинисто-солонцеватой степи).

32. *Messor barbarus incorruptus* Ruzsky.

Муравей этот впервые был найден мною в Закавказье и описан под именем *Messor barbarus aegyptiacus* (Emery), var. *incorruptus*. Но теперь, тщательно сравнив