

Третью экскурсию я сделал в 1916 году в восточную Сибирь: в Иркутскую губернию, в Забайкальскую и Амурскую области. Из Томска я проехал в Иркутск, затем на Байкал (юго-западный берег у сел Лиственничного и Голоустного), далее в Верхнеудинск, потом по Селенге в Троицкосавск и Усть-Кяхту; оттуда сделал экскурсию в северно-восточную Монголию, в степь между Маймачином и Ургой. Из Троицкосавска я вернулся в Верхнеудинск, оттуда проехал на Читу и Сретенск, далее по Амуру в Благовещенск и Хабаровск. Из Хабаровска ездил по Уссури уже в пределах Приморской области в станицу Козловскую.

*Camponotus herculeanus* L. var. *sachalinensis* For. Две ♀♀ взяты мной в окр. Хабаровска, в смешанном лесу под мхом 4. VIII. 16. — *C. h. whymperi* For. Забайкал. обл.: окр. Сретенска, 24. VII. 16; гнезился под корой пихтового пня; ст. Буссе на Амуре, 26. VII. 16. — *C. h. var. montanus* Ruzsky. Енис. губ.: Волгина гора на лев. бер. Енисея, крыл. ♀♀. 10. VIII. 16; Иркут. губ.: окр. Иркутска, VI. 16; Верхнеудинск, соснов. бор, 19. VI. 16; окр. Сретенска, VII. 16; ст. Поворная на Амуре, VII. 16; Хабаровск, смешан. лес, 11. VIII. 16. — *C. h. japonicus* Maug. Енис. губ.: Усть-Ербинская пристань на Енисее, Волгина гора, VI. 15; окр. Минусинска, Тагарский остров, ♂ и ♀, 19. VIII. 15; Иркутск. губ.: окр. Иркутска, 10. VI. 16; с. Лиственничное на Байкале, ♀♀ и ♀, 18. VII. 16; Забайкал. обл.: окр. Верхнеудинска и Читы, листв. лес, 19. VI. 16; Амур. обл.: ст. Утесная на Шилке, ст. Буссе, Раддевка, Благовещенск и Хабаровск, 30. VII — 5. VIII. 16. — *C. h. japonicus* Maug. var. *mandzhuricus* Ruz. Ст. Козловская на Уссури, 8. VIII. 16. — *C. h. saxatilis* Ruzsky. Томск. губ.: окр. Томска, соснов. бор; Енис. губ.: с. Голоустное на Байкале, VI. 16; ♂♂. — *C. h. saxatilis* Ruzs. var. *altaica* Ruzsky. Забайкал. обл.: окр. Читы, листв. лес, 18. VII. 16, ♀. — *C. marginatus* (Latr.) var. *rubicolor*, пова ♀. Отличается (♀) от типичной формы более светлой окраской. Все тело бледно-коричневого цвета; голова буро-красная; ноги желтовато-коричневые с желтыми лапками. Голова и thorax с мелким пунктиром, без отстоящих и прилегающих волосков. Дл. 5—8 мм. Окр. Хабаровска, лиственный лес; гнезился под камнями, в норах, 3. VIII. 16; ст. Утесная на Шилке, на каменистом лесном склоне, ♂♂, 27. VII. 16. — *C. m. quadrinotatus* (For.). Амур. обл.: окр. Хабаровска, листвен. лес, 4. VIII. 16. — *C. m. quadrinotatus* (For.) var. *nigricolor* пова ♀. Весь черного цвета (♀); усики, челюсти и ноги темно-коричневые с более светлыми (желтоватыми) лапками. Брюшко без желтых пятен на первых двух сегментах. Примор. обл., ст. Козловская на Уссури, смешан. листв. лес 8. VIII. 16. — *C. m. vitiosus* Emery. Один экземпляр ♀ у ст. Козловской на Уссури, Примор. обл., 8. VIII. 16, на коре дуба. До сих пор известен был из Японии. — *C. m. brunni* Emery. Амур. обл.: окр. Хабаровска, на лесистом склоне левого берега Уссури, ♂♂ под камнем, в землян. норах, 7. VIII. 16. Известен был только из Японии. — *C. (Orthonotomyrmex) lateralis* Ol. *merula* Dosana. Амурская обл.: окр. Благовещенска, отдельные ♂♂, ползавшие на сте-