

блях ивы ради тлей, в песчаной местности в долине левого берега Зеи, 27. VII. 16. Нахождение этой средиземноморской формы на Амуре представляет очень интересный зоогеографический факт; в Европ. России была известна из южной России, Крыма и Кавказа. — *Formica rufa* L. Енис. губ.: окр. Красноярска, ст. Усть-Ербинская; окр. Минусинска, соснов. бор, VII—VIII. 16; Иркут. губ.: окр. Иркутска, берег Байкала, 12. VI. 16; Забайкал. обл.: окр. Верхнеудинска, Чита, Сретенск, ♀ и ♂, 19. VII. 16; Амур. обл.: окр. Хабаровска, листв. лес, ♀, 5. VIII. 16. — *F. r. truncicola* Nyl. var. *yessensis* For, Забайкал. обл.: окр. Читы, листв. лес в долине Ингоды, крыл. ♂ и ♀, 18. VII. 16; окр. Усть-Кяхты, 12. VII. 16, ♀; Амур. обл.: окр. Хабаровска, листв. лес, 5. VII. 16. — *F. r. pratensis* Retzius. Очень обыкновенна во всей южной и средней Сибири до Камчатки; мною найдена как в лесах, так и в степях Енисейской и Иркутской губ., в Забайкальи и Амур. обл.: ст. Константиновская, Никольская, окр. Хабаровска; окр. Троицкосавска на пути в Кяхту, в степи с редкими соснами, 10. VII. 16, крыл. ♀ и ♂, и в Примор. обл.: ст. Козловская. — *F. uralensis* Ruzsky. Енис. губ.: окр. Минусинска, Тагарский остров, на сырватом лугу при склоне в долину небольшого озера, крыл. ♂ и ♀, 20. VIII. 16; другой муравейник с земляным кольцевым валиком, проросшим мелкой травой и с закругленным конусом найден к Ю от Минусинска в степи у опушки соснового бора, 21. VIII. 15; Туруханский край: окр. Туруханска, гнездо находилось среди болота в сухой кочке (В. Ревердатто, 1917). Последнее очень интересное местонахождение представляет самый северный пункт распространения этого вида в Сибири. — *F. exsecta* Nyl. Иркут. губ.: окр. Иркутска, долина Ангары, VI. 16; Забайкал. обл.: окр. Верхнеудинска, соснов. бор.; окр. Читы, смешан. соснов. бор, крыл. ♀ и ♂, 17. VII. 16; Амур. обл.: ст. Буссе и окр. Хабаровска, опушка листв. леса, 2. VIII. 16. — *F. e.* var. *rubens* For. Иркут. губ.: с. Лиственичное на Байкале, 12. VIII. 16, ♀ и ♂. — *F. e. pressilabris* Nyl. Енис. губ.: окр. Минусинска, степь, ♀ и ♂, 20 и 21. VIII. 15; Мажарские озера, каменистый склон, 22. VIII. 15; Амур. обл.: окр. Благовещенска, Албазин, на каменист. склоне долины Амура, 28. VII. 16. — *Raptiformica sanguinea* Latr. var. *mollesonae* Ruzs. Забайкал. обл.: окр. Усть-Кяхты, степь с редкими соснами, гнездо совместно с *Formica rufa* Nyl., крыл. ♂ и ♀, 13. VII. 15; окр. Читы, соснов. бор, 9. VIII. 16; Сретенск, долина Ингоды, 21. VII. 16. — *R. s.* var. *clarior* Ruzsky. Амур. обл.: ст. Буссе, отдельные ♀♂, ползавшие на опушке лиственн. леса, 27. VII. 16. Разнообразность эта до сих пор известна была только с Кавказа: Дагестан, Абастуман. — *Serviformica fusca rufa* Nyl. Очень обыкновенна в восточной Сибири, Монголии и Манчжурии, найдена мною в разных местах Иркут. губ., в Забайкальи и в Амур. области до Хабаровска; имеются у меня экземпляры и из Владивостока и Кореи. Стации ее довольно разнообразны: поляны и опушки лесов, травянистые и каменистые степи, степные склоны и горные хребты до границы снежной линии. Крылатые ♀ и ♂ встречались мне в июле и августе. —