

*S. f. picea* Nyl. var. *inplana* Ruzs. Амур. обл.: окр. Хабаровска, лесист. и каменистые склоны долины Амура, песчаные местности с редким лиственным лесом, крыл. ♂ в муравейниках наблюдались 2—5. VIII. 16; Забайкал. обл.: окр. Троицкосавска и Кяхты, Ново-Селенгинск; северо-восточная Монголия, Маймачин и степь и болотистые луга около озер Среднего и Дзержинского, также в долинах рек Буры и Орхона, 12. VII. 16. Кроме Сибири эта форма распространена по всей Монголии и в Тибете и на Камчатке (см. мою статью «Муравьи Камчатки». Изв. Инст. Исслед. Сибири, № 2, 1920 г., стр. 76). — *S. f. picea* Nyl. var. *orientalis* Ruzsky. Забайкал. обл.: окр. Нижнеселенгинска, на песках долины Селенги, VII. 16; по дороге между Усть-Кяхтой и Маймачином, полынная степь, ♀, 12. VII. 16. — *S. f. fusca* L. Обыкновенна по всей Сибири в равнинной и горной тайге; найдена мною и в Амур. обл.: Баргузин, окр. Хабаровска, листв. лес; крыл. ♂ и ♀, 2—5. VIII. 16. — *S. f. pyrroneurus* For. Амур. обл.: окр. Хабаровска, 5. VIII. 16; Приморск. обл.: ст. Козловская на Уссури, 8. VIII. 16, лиственн. лес; Владивосток. — *Formica cinerea* Maug. Забайкал. обл.; долина Селенги у Новоселенгинска, на песках, поросших *Iris sibirica*, 7. VII. 16, крыл. ♂ и ♀ в земляных норах. — *F. rufibarbis* Fabr. Енис. губ.: окр. Красноярска, долина Енисея, песчаные холмы при устье р. Маны, крыл. ♂ и ♀, 7. VI. 15; окр. Минусинска, соснов. бор, VII. 15; Амурская обл.: Хабаровск, 4. VIII. 16; Забайкал. обл.: Троицкосавск и Кяхта, на улицах и в садах, ♀♀, 12 и 13. VII. 16. — *F. r. subpilosa* Ruzsky. Енис. губ.: окр. Минусинска, песчаная степь, ♀♀ 22. VIII. 15; Забайкал. обл.: окр. Верхнеудинска, соснов. боры, ♀ и ♂, 7. VII. 16. — *F. r. subpilosa* Ruzs. var. *clarior* Ruzsky. ♀♀ в травянистой степи по дороге между Маймачином и Усть-Кяхтой, 12. VII. 15. Разновидность эта, отличающаяся очень светлой окраской, принадлежит высокому среднеазиатскому нагорью (Тибет). — *F. r. clara* For. Забайкал. обл.: окр. Верхнеудинска, ♀ и ♀, 5. VII. 16; Троицкосавск, 15. VII. 16; ст. Дзокуй на Селенге, на безлесном степи. склоне, ♀♀, 9. VII. 16; песчаная степь у Дзержинского озера ок. Маймачина, ♂, ♀, 12. VII. 16. — *Proformica mongolica* Emery. Ст. Номохонова на Селенге, на песчаных холмах среди редкой травянистой растительности, ♀, 10. VII. 16. — *Acanthomyops (Donisthorpea) niger alienus* Först. ♀, ♂, ♀. Довольно обыкновенен в Минусинском уезде, в сосновых борах и на степных склонах, затем встречается в Иркут. губ. и в Забайкал. обл.: Верхнеудинск, Ново-Селенгинск, Кяхта; в Амур. обл. в окр. Хабаровска, на речн. склонах, крылат. ♂ и ♀, 4 и 5. VIII. 16. — *A. (Ch.) flavus* De Geer var. *odoratus* Ruzsky. ♀♀ в Амур. обл.: окр. Благовещенска и Хабаровска. — *A. (Ch.) f. myops* For. ♀, ♂, ♀. Забайкал. обл.: Верхнеудинск, Троицкосавск, Чита, крыл. ♂ и ♀, 17. VIII. 16; Амур. обл.: окр. Хабаровска, ♀, 3. VIII. 16. — *A. (Ch.) umbratus* Nyl. Обыкновенен в окр. Томска, соснов. бор в Городке, крыл. ♀ и ♂ в июле и начале августа; Минусинск, Иркутск, Чита; в Амур. обл.: окр. Хабаровска и ст. Радевка, в листв. лесах. — *A. (Ch.) exacutus* Ruzsky. Амур. обл.: окр. Хабаровска.