

ровска, ♀♀ на песках при устье Уссури, 4. VIII. 16. — *A. (Ch.) mixtus* (Nyl.) ♀, ♀, ♂. В Забайкал. обл.: окр. Читы, и в Амур.: Хабаровск; также в окр. Минусинска и на Волгиной горе на лев. бер. Енисея, крыл. ♂ и ♀ в июле. 1915 г. — *A. (Ch.) bicornis affinis* Schenck. Амур. обл.: окр. Хабаровска, листв. лес, ♀♀, 3. VIII. 16. — *A. (Ch.) carniolicus* Maug. ♀, ♀. Один муравейник в песчаном холмике ок. Ново-Селенгинска Забайкал. обл., в долине Селенги. Енис. губ.: окр. Минусинска, Тагарский остров, в каменной степи, гнезился под камнями, крыл. самки в конце июля. — *Dendrolasius fuliginosus* (Latr.) Амур. обл.: окр. Хабаровска, в лиственн. лесу, крыл. ♂ и ♀, 5. VIII. 16. — *Dolichoderus quadripunctatus sibiricus* Emery. ♀. Амур. обл.: ст. Козловская на Уссури, листв. лес, 7. VIII. 16. — *Tapinoma sessile* (Say). Иркут. губ.: окр. Иркутска и с. Голоустное на Байкале, ♀, VII. 16. Забайкал. обл.: Чита, 17. VII. 16, ♀ и ♀, в листв. лесу; Амур. обл.: окр. Хабаровска, в листв. лесу, ♀, 2. VIII. 16. — *T. s. var. boreale* Roger. Забайкал. обл.: на пути между Троицкосавском и Кяхтой, в степи среди редких сосен, ♀♀, 13. VIII. 16; Ново-Селенгинск, ♀. — *Liometopum microcephalum* (Panz.) var. *occidentale* Emery. Амур. обл.: окр. Хабаровска, лиственн. лес, ♀♀, 3. VIII. 16. Разновидность эта известна была до сих пор из средней Америки. — *Tetramorium caespitum* (L.). Обыкновенен во всей средней полосе Сибири: Иркутск, Верхнеудинск, Чита, Троицкосавск, Сретенск, Хабаровск. — *Myrmecina graminicola* (Latr.) Амур. обл.: окр. Хабаровска, листв. лес, 5. VIII. 16, ♀. — *Formicoxenus nitidulus* (Nyl.). В гнездах *Formica rufa*, *pratensis* и *uralensis*: окр. Минусинска, Иркутск, Чита, Сретенск, Хабаровск. — *Myrmoxenus gordjagini* Ruzsky. Алтайск. губ.: с. Мартыновское, на степном склоне, поросшем ковылем, в гнезде *Leptothorax serviculus* Ruzs. — *Leptothorax nasonovi* Ruzsky. Енис. губ.: окр. Минусинска, Тагарский остров, каменная степь, 15. VIII. 15; Забайкал. обл.: Ново-Селенгинск; Амур. обл.: окр. Хабаровска, ♀ 4. VIII. 16. — *L. tuberculatum* (Fabr.) var. *nigriceps* Maug. Алтайск. губ.: окр. Бийска; северный Алтай: с. Черга, ♀, VII. 14. — *L. stipaceus* Ruzsky. ♀. Алтай: степные склоны у с. Мартыновского, между Кузнецком и Бийском, VI. 14; Забайкал. обл.: Ново-Селенгинск, VII. 16. — *L. serviculus* Ruzsky. Алтайск. губ.: с. Мартыновское, степные склоны, совместно с *Myrmoxenus gordjagini*, норы в земле, ♀♀, 18. VI. 14. — *L. nylanderi* Foerst. Алтайск. губ.: Бийский у., степной склон у с. Сухой Чемровки, ♀♀, 17. VI. 15. — *L. (Mychothorax) acervorum* (Fabr.). Обыкновенен в Сибири, на восток до Камчатки. — *L. (M.) muscorum* (Nyl.). Очень обыкновенен в Сибири. Найден мною в губ. Енис.: Минусинск, Иркут., в Забайкал. и Амурск. обл.: окр. Хабаровска, крыл. ♀ и ♂, 4. VIII. 16, в лиственн. лесу, гнезд под горой пней. — *L. (M.) hirticornis* Emery var. *sibiricus* For. Амурск. обл.: окр. Хабаровска, ♀ в лиственн. лесу, 3. VIII. 16. Северный Алтай: Черга, VII. 14. — *Monomorium pharaonis* (L.). Был наблюдаем мною в домах Хабаровска и Петропавловска. — *Myrmica scabrinodis kaschenkoii* Ruzs. var. *subaltaica* nova ♀. Отличается от типичной формы более светлой окраской, более короткими и прямыми шипами задне-