

Körper heller gefärbt.

Kopf rot. Mandibeln dunkelbraun bis rotbraun, stark glänzend, ohne abstehende Behaarung.

Clypeus in der Mitte mehr oder weniger gebräunt.

Stirn und Scheitel (bis zur Hälfte der Augen) schwarz bis bräunlich schwarz.

Thorax hell rot. Oberrand des Pronotums, Scutum, Scutellum und Metanotum schwarz bis bräunlich schwarz. Scutellum matt glänzend.

Schuppe, Coxen und Proximalteile der Schenkel lebhaft rot, der Rest der Beine mehr oder weniger dunkel gefärbt, bräunlich rot.

Rot gefärbtes Basalteil der Gaster übersteigt die Schuppe.

Gaster schwarz bis bräunlich schwarz, glänzend.

An der Aussenseite der Tibien sind keine abstehenden Borsten.

Körper dunkler gefärbt als bei der Stammform.

Kopf dunkelrot. Mandibeln gewöhnlich dunkelbraun, glänzend, mit abstehtender Behaarung.

Clypeus fast ganz rötlich dunkelbraun; in der Mitte bräunlich schwarz.

Stirn und Scheitel (bis hinter den Augenvorderrand) schwarz.

Thorax dunkelrot. Fast ganze Pronotum, Scutum, Scutellum und Metanotum schwarz. Scutellum stark glänzend.

Schuppe dunkelrot, Coxen und Beine ganz dunkel gefärbt, dunkel rötlich braun bis schwarzbraun, nur die innere Seite der Schenkel des hinteren Beinpaars deutlich rot.

Dunkelrot gefärbtes Basalteil der Gaster ist durch die Schuppe bedeckt.

Gaster schwarz, stark glänzend.

An der Aussenseite der Tibien befinden sich kurze, abstehende Borsten.

V Krkonoších jsem sbíral jen velmi příležitostně, a to po prvé v červenci 1951 (Kotel, louka Pančice), po druhé v květnu 1952 (okolí Sněžky), ale i tak mohu konstatovat, že myrmekofauna těchto nejvyšších hor Čech je druhově značně chudá, chudší nežli šumavská. Zjištěny zde byly druhy (do tohoto seznamu pojmám i druhy, které tu přede mnou sbírali jiní sběratelé):

1. *Myrmica* (*N.*) *rubida* LATR., 2. *M.* (*M.*) *laevinodis* NYL., 3. *M. rubra* L. s novou, odtud popsanou varietou var. *mutata* SADIL, 4. *M. sulcinodis* NYL. (Kotel, 6. VII. 1951, SADIL), 5. *M. lobicornis* NYL. (Kotel, 6. VII. 1951, SADIL), 6. *Leptothorax* (*M.*) *acervorum* FABR., 7. *L. (L.) niger* L., 8. *L. flavus* FABR., 9. *Formica* (*R.*) *sanguinea* LATR., 10. *F. (F.) truncorum* FABR., 11. *F. (S.) fusca* var. *lemanii* BONDR., 12. *Camponotus herculeanus* L., 13. *C. h.* var. *herculeano-ligniperda* FOR., 14. *C. ligniperda* LATR.

Ani v Krušnohoří (rašelinisté poblíž Sv. Šebestiána, Hora sv. Kateřiny), kde jsem sbíral každým rokem od r. 1947 až do r. 1952, jsem neshledal bohatší mravenčí zvířenu, ačkoliv jsem tu našel více druhů a také četnější osídlení mravenci nežli v Krkonoších (patrně proto, že tato naleziště jsou méně izolována a mnohem níže položena, takže sem vniká mnoho mravenčích druhů z okolních nižších poloh). Z druhů, které nebyly uvedeny ani ve výčtu krkonošských ani šumavských mravenců dlužno odtud jmenovat jedině: *Myrmica* (*M.*) *scabrinodis* NYL. (rašelinisté u sv. Šebestiána, 29. VII. 1951, SADIL).