

Das Vaterland dieser Art, von der ich eine Anzahl Arbeiter und geflügelte und ungeflügelte Weiber zur Beschreibung hatte, ist wahrscheinlich Ceilon.

Dieser Art sehr ähnlich scheint *F. conica* F. (Suppl. ent. syst. 279. 27) zu sein; dieselbe hat auch einen konischen Hinterleib, ist aber ganz schwarz. Ihre Heimath ist Tranquebar. *F. flavescens* (Ent. syst. II. 353. 12.) scheint kein zugespitztes Abdomen zu haben und ist von *acutiventris* ohne Zweifel verschieden.

8. *Dolichoderus scabridus*.

♀ *D. niger, subnitidus, pilosus, abdomine pilis aureis adpressis vestito, pedibus rubris, metanoto spinis quibus longis, squama transverse compressa, rotundata.* — Long. 6—7 Millim.

Schwarz, wenig glänzend, die Beine sind roth, die vorderen Schienen und Tarsen öfters schwärzlich; der Hinterleib ist mit feinen, goldglänzenden, dicht anliegenden Härchen bedeckt; der ganze Körper sammt dem Fühlerschaft und den Beinen ist mit kurzen, gelblichen, abstehenden Börstchen besetzt. Der Kopf ist eiförmig, hinten nicht halsförmig, und ebenso, wie der Thorax und die Schuppe, sehr grob, grübchenartig und gerunzelt punktirt. An der Grenze zwischen Meso- und Metanotum ist der Thorax stark eingeschnürt; das letztere trägt hinten 2 starke divergirende, nach oben und etwas nach aufsen gerichtete, lange, spitzige und theilweise roth gefärbte Dornen, und ist an seiner abschüssigen Fläche glatt und glänzend. Die Schuppe ist vorn und hinten zusammengedrückt und oben abgerundet. Der Hinterleib ist viel breiter als der Kopf, vorn abgestutzt.

Mehrere ♀ von verschiedenen Orten Australiens.

9. *Leptogenys falcata* Rög. (Berl. Ztschr. 1861. S. 42. ♀.)
Dazu Taf. I. Fig. 14. Kopf ♀, a. Flügel.

Bisher waren von dem Genus *Leptogenys* nur ♀ bekannt; von H. Gundlach habe ich neuerdings auch einige ♂ der *Lept. falcata* erhalten, deren Beschreibung hier folgt.

♂ *Niger, subnitidus, plus minus subtilissime cinereo-pruinosis, mandibulis, clypeo, antennis, abdomine marginibus pedibusque ferrugineis. Antennae 13-articulatae. Clypeus in fronte rotundatus sine dentibus. Mandibulae breves edentulae, marginibus parallelis. Squama crassa, rotundato-quadrata. Abdomen inter segmentum I et II constrictum. Genitalia parva abscondita. Ala antica leviter*