

или почти гладкая в нижней части, в верхней же с продольными морщинками, спускающимися со лба. Шипы на заднеспинке немного короче ее основной поверхности, они тонкие и немного выгнутые. Покатая поверхность заднеспинки между шипами матовая, часто поперечно штриховатая. Перетяжка между meso- и metanotum не сильная. Голова в thorax продольно грубо-морщинистые; узелки стебелька со слабыми тонкими морщинками, верхняя поверхность второго узелка почти гладкая. Брюшко гладкое и блестящее.

Тело покрыто редкими отстоящими волосками. Цвет его темно-краснокоричневый; брюшко черно-коричневое. Лапки и кончик булавки желтовато-коричневые.

Длина тела 4—5,5 мм.

Ближе всего этот новый вид, который называю в честь Г. В. Штанге, стоит к *Myrm. lobicornis*, но совершенно ясно отличается от него отсутствием лопасти на стигме рукояти усиков и иной структурой лобной площадки и покатои поверхности заднеспинки.

Найдена была эта мирмика в окрестностях Иргиза и Тургай, на глинистой полевой стене.

13. **Aphaenogaster structor** Latr. Добыть былъ на стене по течению р. Бердянки г. В. Ш. Биркѣ. Въ окрестн. Тургай найдены г. Штанге.