

A new species sp. n. from the Transcaspian region

Новый видъ муравья изъ Закаспійской области.

М. Рузского (Казань).

Въ мирмекологическомъ матеріалѣ, любезно доставленномъ мнѣ гг. А. П. Семеновымъ и В. А. Арнольдовымъ изъ Закаспійской обл., между прочими интересными находками, оказался одинъ новый видъ муравья изъ р. *Myrmecocystus*, которому я даю имя въ честь известного мирмеколога, моего друга, А. в. г. Фореля.

Этотъ видъ съ одной стороны близко стоитъ къ *Myrm. viaticus* Fabr., съ другой — къ *Myrm. altisquamis* André, занимая какъ бы середину между ними. По окраскѣ онъ сходенъ съ *Myrm. viaticus* var. *niger* André; по формѣ и строенію чешуйки — съ *Myrm. altisquamis*.

*Myrmecocystus foreli*, n. sp.

♀. Цвѣтъ тѣла совершенно черный, матовый. Лапки, жгутикъ усиковъ и верхнія челюсти черно-коричневыя.

Глаза большие, овальные, выпуклые, по крайней мѣрѣ вдвое больше, чѣмъ у *M. altisquamis* и *viaticus*, лежать по бокамъ головы близь закругленныхъ ея заднихъ угловъ. Длина глаза почти равна разстоянію отъ его передняго края до мѣста прикрепленія челюсти. Лобная площадка хорошо видна, слабо блестящая.

Заднеспинка выпуклая, сильно приподнятая и болѣе высокая чѣмъ у *M. viaticus* и *altisquamis*. Стебелекъ снабженъ не узломъ, какъ у *M. viaticus*, а чешуйкой, довольно высокой, толстой при основаніи, сверху съуживающейся и тупо закругленной. Спереди она выпуклая, выдаваясь въ формѣ туного угла, сзади вогнутая; верхній край ея довольно толстый, закругленный и съ небольшой выемкой посерединѣ. У *M. altisquamis* чешуйка менѣе толстая при основаніи и сверху болѣе широко закруглена, не образуя спереди тупоугольной выпуклости. У мелкихъ экземпляровъ *M. foreli* чешуйка болѣе толстая при основаніи, менѣе высокая и сверху тупоугольная. Въ вышину чешуйка нѣсколько ниже заднеспинки. У *M. altisquamis* заднеспинка болѣе плоская и чешуйка почти равна ей въ вышину. Брюшко высокое, короткое, съ боковъ не сдавленное.