

солончакахъ и пр.), также въ горахъ, достигая границы вѣчнаго снѣга. Стroyть многочисленные земляные холмики, обыкновенно зарастающіе травой или мхомъ, рѣже селятся подъ камнями (на каменистыхъ мѣстахъ).

Челюстной щупальца у нихъ короткія (см. рис. 3), далеко не достигающія до затылочного отверстія, съ последовательно укорачивающимися члениками, наименѣе сть 3-го, самаго длиннаго; 4-й ихъ длинѣрѣвъ  $1\frac{1}{2}$ , раза болѣе двухъ послѣдующихъ, т. е. 5-и 6-го, взятыхъ вмѣстѣ. Поверхность тѣла болѣе или менѣе матовая, мелко и тонко морщинистая, съ густыми прилегающими волосами, и въ большинствѣ случаевъ довольно частыми отстоящими. Величина тѣла у рабочихъ особей маленькая (1,7—4,5 мм.). Чешуйка, обыкновенно съ вырезкой на верхнемъ краѣ. Цвѣтъ у всѣхъ видовъ желтый или блѣдо-желтый.

Такимъ образомъ я предлагаю прежній монотипный родъ муравьевъ-лазіусовъ *Lasius* Fabr. разделить на слѣдующія группы (подроды):

Gen. *Lasius* Fabr. (s. ext.):

рис. 3. Челюстное щупальце  
*Las. flavus* (рабочій, изъ окр.  
Казани).

1) Subg. *Lasius* (Fabr.) m. (s. str.). Виды и расы: *Lasius* (*Lasius* s. str.) *niger* (Lin.), *emarginatus* (Oliv.), *flavescens* For., *alienus* (Foerst.), *brunneus* (Ltr.), *temerarius* Ruzsky.

2) Subg. *Dendrolasius* Ruzsky. Видъ: *Lasius* (*Dendrolasius*) *futiliginosus* Ltr.

3) Subg. *Chtonolasius* Ruzsky. Виды и расы: *Lasius* (*Chtonolasius*) *flavus* D. G., *umbratus* (Nyl.), *mixtus* (Nyl.), *exacutus* Ruzsky, *bicornis* (Foerst.), *affinis* Schenck, *minutus* Ein., съ разновидностями: *odonatus* Ruz., *flavooides* For., *aphidicola* Walsh., *fuscocoides* Ruz. и др.

Такое деленіе лазіусовъ, по моему мнѣнію, является вполнѣ естественнымъ: оно основывается какъ на морфологическихъ (морфоматическихъ) признакахъ этихъ муравьевъ, такъ и на биологии ихъ.

