

Ants of Surgut district, Tobolsk province.

Проф. М. Д. Рузскій (Томскъ).
Муравьи Сургутскаго уѣзда Тобольской губерніи.

Prof. Dr. M. Ruzsky (Tomsk).
Ameisen aus Surgut, Gouvernement Tobolsk (Sibirien).

Лѣтомъ прошлаго (1913) года ассистентъ при зоологическомъ кабинетѣ Императорскаго Томскаго Университета д-ръ С. М. Чугуновъ былъ командированъ въ Сургутскій уѣздъ Тобольской губерніи для зоологическихъ изслѣдованій. Между различными зоологическими коллекціями, собранными имъ и поступившими въ Зоологическій Музей университета, оказались и муравьи, описанію которыхъ и посвящается настоящая статья.

Сборы муравьевъ производились въ окрестностяхъ г. Сургута, лежащаго на правомъ берегу р. Оби, и около с. Юганскаго, находящагося недалеко отъ Сургута, на противоположной сторонѣ названной рѣки. Мѣстность около обоихъ пунктовъ представляетъ типичную тайгу съ преобладаніемъ мѣстами сосны (Сургутъ), мѣстами ели (Юганское). Хотя мирмекологическая коллекція д-ра Чугунова и не особенно велика, состоя всего изъ 11 формъ (видовъ, расъ и разновидностей), тѣмъ не менѣе она представляетъ несомнѣнный интересъ не только потому, что заключаетъ въ себѣ новыя формы, но и въ томъ еще отношеніи, что она собрана въ мѣстности, лежащей далеко на сѣверѣ (ок. 62° с. ш.), близко граничащей съ тундрой и притомъ въ зоологическомъ отношеніи совершенно еще не изслѣдованной.

Camponotinae.

Camponotus herculeanus L. (typ. et ad var. *shitkovi intermedius*). ♀, ♂.

Красногрудый кампонотусъ, обычно гнѣздящійся въ старыхъ деревьяхъ, по преимуществу хвойныхъ, — типичный обитатель тайги. Найденъ въ окр. г. Сургута, въ тайгѣ съ преобладаніемъ сосны, въ іюнѣ 1913 г., въ количествѣ 41 экз. (19 безкр. ♀♀ и 22 ♂♂) и