

C. saxatilis aus Surgut bildet einen Uebergang zu *C. aterrimus* Emery (var. *saxatile-aterrimus* m.).

3. *Formica rufa* L. (s. str.) ♀.

Три экземпляра рабочихъ взяты въ окр. Юганскаго (24. VI.) и 19 ♂♂ въ ок. г. Сургута (13.—21. VI.) изъ обычныхъ своихъ холмообразныхъ насыпныхъ гнѣздъ, въ тайгѣ.

Въ предѣлахъ Тобольской губ. вообще очень обыкновененъ и многочисленъ въ разныхъ лѣсахъ, не исключая и ея южной части.

4. *Formica rufa* L. var. *tshugunovi*, var. n. (♀).

♀. Лобная площадка съ очень мелкой поперечной морщинистостью, весьма слабо блестящая. Темное пятно на pro-mesonotum значительно развито, большое. Кромѣ этого еще отмѣчается рѣдкими, тонкими отстоящими волосками на thorax'ѣ, такъ что въ двухъ послѣднихъ отношеніяхъ нѣкоторымъ образомъ приближается къ *T. pratensis* Retz.

Найденъ 1 ♀ (мелкій экз.) въ окр. с. Юганскаго, 24. VI. Называю его въ честь д-ра С. М. Чугунова. Мнѣ помнится, что подобную разновидность я встрѣчалъ и въ Европ. Россіи (Казанская губ., Уралъ), такъ что она, очевидно, не мѣстнаго происхожденія.

Nur ein kleines Exemplar ♀ aus Umgegend von Juganskoje (Gouv. Tobolsk) gefunden.

Unterscheidet sich dadurch, dass das Stirnfeld eine sehr feine Querrunzelung aufweist und fast glanzlos ist; die dunkle Makel auf dem Pro-mesonotum ist bedeutend entwickelt; auf dem Thorax seltene, dünne abstehende Härchen.

5. *Formica rufa pratensis* Retz. var. *unicolor*, var. n. (♀).

♀. Отличается болѣе свѣтлой, однообразной окраской всего тѣла, безъ чернобурыхъ пятенъ на головѣ и thorax'ѣ. Совершенно матовый. Волосистость болѣе короткая и густая.

Голова, thorax, чешуйка, ножки и рукоять усиковъ матоваго тусклаго коричневаго-краснаго цвѣта; верхняя поверхность головы (лобъ и темя) и стебелекъ усиковъ коричневатые; брюшко коричневое; чернобурыхъ пятенъ на головѣ и груди совсѣмъ нѣтъ. Все тѣло, кромѣ усиковъ, покрыто очень частыми, густыми короткими отстоящими волосками сѣроваго цвѣта; на ножкахъ (бедрахъ и голеняхъ) эти волоски болѣе рѣдки. Глаза съ волосками, какъ и у типичной формы. Поверхность тѣла, особенно головы и груди, тускло-матовая. Дл. ок. 6 мм.

Эта интересная разновидность по отсутствію темныхъ пятенъ на головѣ и груди какъ-бы напоминаетъ *F. rufa truncicola* Ny l.,