

Очевидно, *F. exsecta* и на сѣверѣ Тобольской губ. также обыкновененъ, какъ и на югѣ. По крайней мѣрѣ въ Курганскомъ уѣздѣ этотъ муравей является обычнымъ жителемъ березово-осиновыхъ лѣсовъ.

7. *Formica fusca* L. (s. str.) ♀.

Въ окрестностяхъ с. Юганскаго добыто 5 экз. ♀♀ этого обыкновеннаго лѣснаго муравья, а около г. Сургута взято 15 ♀♀ — всѣ въ глухой тайгѣ. Гнѣздится въ пняхъ и въ землѣ. Въ Тобольской губ. вообще обыченъ (въ разныхъ лѣсахъ).

8. *Formica fusca glebaria* Ny l. ♀.

Найдены только рабочіе этой расы въ окрестностяхъ г. Сургута, въ сосновой тайгѣ, 13. VI. въ количествѣ 14 экз., а около с. Юганскаго добыто 10 штукъ (24. VI.), въ еловой тайгѣ.

Нужно замѣтить, что эта раса и *F. fusca* (typ.) очень близки между собой. Поэтому ихъ долго смѣшивали. Хотя Nylander¹⁾ еще въ 1846 г. описалъ *F. glebaria* изъ Финляндіи, но это описание было какъ-то забыто и долго оставалось въ пренебреженіи у мирмекологовъ. Въ этомъ повиненъ отчасти и авторъ настоящей статьи. Лишь проф. С. Емегу²⁾ въ 1909-омъ году вывелъ его изъ забвенія.

F. glebaria отличается отъ *fusca* главнымъ образомъ формою *metanotum* и отчасти опушеніемъ брюшка. Именно заднеспинка (*metanotum*) у *F. fusca* typ. болѣе выпуклая, будучи правильно овально-закругленной (какъ у *F. gagates* Ltr.), а у *glebaria* она болѣе плоская и угловатая (какъ у *F. fusca picea* Ny l.), почему ея основная поверхность является болѣе длинной, а покатая—болѣе короткой, причемъ на границѣ той и другой образуется замѣтный, закругленный уголъ. У *F. fusca* (typ.) такого угла нѣтъ и заднеспинка равномернѣе выпукла. Затѣмъ опушеніе на тѣлѣ, особенно на верхней поверхности брюшка, у *F. glebaria* представляется болѣе частымъ.

Проф. С. Емегу считаетъ *F. glebaria* Ny l. за *varietas F. fusca* L., но мнѣ кажется болѣе правильнымъ принимать эту форму за расу или подвидъ. Дѣло въ томъ, что проф. Емегу не подмѣтилъ различія въ строеніи заднеспинки *F. glebaria*, а говорить только про опушеніе поверхности тѣла, въ чемъ и видитъ ея главное различіе отъ *F. fusca* (s. str.). Кромѣ того мой взглядъ подтверждается и широкимъ распространеніемъ этой формы (вся Европа, Азія, Алжиръ).

¹⁾ Nylander, W. Adnotationes in monograph. Formicarum borealium Europae. — Actae Sos. Scient. Fennicae, T. II, 1846, p. 917.

²⁾ Емегу, С. Beitr. z. Monogr. d. Formiciden d. paläarkt. Faungebietes. — Deut. Entom. Zeitschr., 1909, Heft II, p. 196.