

Между обѣими этими формами наблюдаются переходы, именно въ строеніи заднеспинки и въ опушеніи (*var. fusco-glebaria* m.). Такіе экземпляры имѣются и въ коллекціи изъ Сургутскаго уѣзда.

Въ предѣлахъ Тобольской губ. эта форма до сихъ поръ не была извѣстна.

Zwischen *F. fusca* und *glebaria* gibt es Uebergangsformen (*var. fusco-glebaria* m.).

9. *Lasius niger* (L.). s. str. (♀).

Этотъ весьма распространенный вообще какъ въ Европѣ такъ и въ Сибири муравей, отличающийся разнохарактерностью мѣстообитанія, найденъ въ Сургутскомъ уѣздѣ въ большомъ количествѣ. Былъ взятъ какъ отдѣльными, ползающими экземплярами, такъ и въ гнѣздахъ, помѣщавшихся въ старыхъ полусгнившихъ пняхъ, составляющихъ въ глухихъ лѣсахъ его обычное жилище.

Въ окрестностяхъ с. Юганскаго добыто было 4 экз. (♀♀); около г. Сургута — 70 (♀♀). Очевидно, тамъ бурый лазиусъ очень обыкновененъ.

Myrmicinae.

10. *Myrmica ruginodis* Ny1. (♀).

Найдена въ количествѣ трехъ экземпляровъ (♀♀) въ окрестностяхъ г. Сургута (13. VI.), въ тайгѣ, для которой она, дѣйствительно, характерна.

11. *Myrmica sulcinodis* Ny1. (♀).

Взяты два экземпляра (♀♀) этой мирмики изъ окр. с. Юганскаго, 24. VI. 1913 г., въ тайгѣ съ преобладаніемъ ели.

Въ Тобольской губ. должна быть рѣдка и раньше найдена мной лишь однажды въ сосновомъ бору на высокомъ берегу р. Иртыша, ок. с. Красноярскаго (Тюкалинскаго уѣзда). Хотя видъ этотъ и имѣеть сравнительно обширную область распространенія (Европа и Азія), но по преимуществу свойственъ горнымъ областямъ. Нахожденіе его въ низменной, равнинной тайгѣ Сибири интересно.