

муравьевъ, напечатанныя или отдѣльными небольшими статьями или чаще разбросанныя въ трудахъ мирмекологовъ Майра, Фореля и Эмери, а также и въ моихъ<sup>2)</sup>. Поэтому нижеописываемая коллекція полк. Козлова является весьма цѣннымъ научнымъ приобрѣтеніемъ, пополняя въ значительной степени существующій пробѣлъ въ нашихъ познаніяхъ муравьевъ центральной Азіи.

Интересна эта коллекція еще и въ отношеніи чисто зоогеографическомъ, такъ какъ заключаетъ въ себѣ главнымъ образомъ высокогорныя формы муравьевъ, обитающія величайшія въ мірѣ пустыни и плоскогорія, высотой въ 8—15000', при условіяхъ суроваго континентальнаго климата.

Главные сборы экспедиціи П. К. Козлова относятся къ восточному и сѣверо-восточному Тибету, собственно областямъ Цайдамъ и Камъ, въ бассейнахъ верхняго теченія рѣкъ Желтой (Хуанхэ), Меконга и Голубой (Янтъ-цзэ), затѣмъ въ горахъ Бурханъ-Будда и Нань-Шань, также около озеръ Куку-норъ и Русскаго (Оринъ-норъ). Имѣются экземпляры муравьевъ еще изъ Алашаня въ южной Монголіи.

## Camponotidae.

### 1. *Camponotus herculeanus aterrimus* Em. (♀).

Имѣется одинъ экземпляръ ♀ (больш.) изъ вост. Цайдама, сѣв.-вост. Тибета.

Отстоящія волоски на тѣлѣ отсутствуютъ; на 3-емъ сегментѣ брюшка прилегающіе золотистые волоски наиболѣе частые (перех. *C. japonicus* Mayr или *C. saxatilis* Ruz.); чешуйка и покатая поверхность заднеспинки красноватая.

Я полагаю, что этотъ кампонотусъ представляетъ самостоятельную расу въ группѣ *C. herculeanus* L. (s. ext.), занимая промежуточное положеніе между типичнымъ *C. herculeanus* и *japonicus*. Съ первымъ онъ сходенъ своимъ короткимъ, рѣдкимъ опушеніемъ брюшка и болѣе плотнымъ строеніемъ тѣла, со вторымъ — темной окраской, золотистыми волосками и отчасти скульптурой и личнымъ щиткомъ. Съ *C. herculeanus* typ. связы-

2) Вся относящаяся сюда литература приведена въ моей работѣ: „Муравьи Россіи“, ч. 1 и 2, 1905—7 г. Казань. (Тр. Казанск. Общ. Ест., т. XXXVIII, вып. 4, 5 и 6; т. XL, вып. 4).