

вается посредством *C. saxatilis*, а съ *C. japonicus* через посредство var. *manczshuricus* var. n. (Описание см. ниже).

Въ географическомъ отношеніи *C. aterrimus* занимаетъ какъ разъ срединную область между районами сплошного обитанія двухъ вышеназванныхъ подвидовъ, будучи распространёнъ въ центральной и восточной Азии, тогда какъ *C. japonicus* свойственъ Японіи и можетъ быть Уссурийскому краю и Манчжуріи, а *C. herculeanus* — Сибири, Европѣ, Кавказу и Тянь-Шаню.

К. Эмери³⁾ считаетъ *C. aterrimus* только за разновидность *japonicus*, съ чѣмъ по моему мнѣнію нельзя согласиться, ибо отъ послѣдняго онъ отличается болѣе рѣзко, чѣмъ это допустимо для разновидности, и притомъ имѣетъ особый ареалъ распространенія. Какъ съ *japonicus*, такъ и *saxatilis* имѣются у него переходныя формы⁴⁾.

C. aterrimus долженъ считаться характерной центрально-азиатской формой. Это типичный горно-пустынный житель. Онъ населяетъ центральную Азію, главнымъ образомъ Тибетъ, Монголію и повидимому бѣольшую часть сѣвернаго и средняго Китая, къ сѣверу достигая до Забайкалья. Къ западу его распространеніе ограничивается предѣлами восточнаго Туркестана, гдѣ онъ пока не найденъ, но можетъ быть есть въ Тянь-Шанѣ. Въ Гималаяхъ его очевидно нѣтъ⁵⁾. Какъ далеко идетъ его распространеніе въ восточной Сибири, еще не извѣстно.

Мѣстонахождение: восточный Цайдамъ, 14—18. IV. 1900, бивуакъ у хырма Барунъ-цааса-ка, 9000', 1 ♂.

Camponotus herculeanus japonicus* var. *manczshuricus
var. nova.

♀. Брюшко сверху покрыто рѣдкими отстоящими щетинистыми волосками, располагающимися главнымъ образомъ рядами по заднимъ краямъ сегментовъ, какъ у *C. saxatilis*, и пучкомъ на верхней поверхности перваго сегмента; кромѣ

3) С. Эмери, Beiträge zur Monographie der Formiciden des paläarktischen Faunengebietes. Deutsche Entom. Zeitschr., 1908, Heft II, p. 186.

4) М. Рязский, Муравьи Россіи, ч. I. (Труды Казанск. Общ. Ест., т. XXXVIII, вып. 4—6, 1905, стр. 239.

5) А. Forel, Les Fourmis de l'Himalaja. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., XLII, 1906, p. 155.