

того они покрывают также нижнюю поверхность брюшка и верхнюю заднеспинки. На остальной части thorax'a и на головѣ имѣются только кой-гдѣ одиночные отстоящіе волоски. Прилежающіе волоски почти такіе-же какъ у *C. aterrimus*, только нѣсколько болѣе частые, но гораздо рѣже и короче чѣмъ у *jaronicus* и *saxatilis*. Личной щитокъ и окраска какъ у *aterrimus*, также и скульптура.

Отъ *C. jaronicus* отливается главнымъ образомъ опушеніемъ брюшка, а отъ *aterrimus* присутствіемъ отстоящихъ волосковъ, которыхъ у послѣдняго нѣтъ. Извѣстное отношеніе обнаруживаетъ и къ *C. saxatilis*.

Мѣстон.: Манчурія, окр. Куан-чэн-цзы, 9. VIII. 1904 (Е. Рузскій) ♂♂; окр. Саминь-хэ, 11. IX. 1904, ♂ (онъ-же); д. Ламатенза, въ 15 верст. къ западу отъ Фынхаза, 28—30. V. 1905, ♂♂ (А. Мартыновъ, получено черезъ Зоологич. Музей Имп. Московск. Унив.).

## 2. *Mymecocystus cursor aenescens* Nyl. var. *tancrei* For.

Эта специально среднеазиатская разновидность чернаго бѣгунка найдена полк. Козловымъ въ количествѣ одного экз. ♂ въ сѣверо-восточномъ Тибетѣ.

Мѣстон.: восточный Цайдамъ, хырма Барунъ-цзасака, 9000', нач. V. 1900, 1 ♂.

## 3. *Formica* (*Serviformica* For.<sup>6)</sup>) *rufibarbis subpilosa* Ruзску.

Область распространенія этого муравья довольно обширна, захватывая центральную Азію, Туркестанъ, юго-западную Сибирь, Кавказъ, сѣверную Персію и юго-восточную часть Европейской Россіи. За предѣлами этихъ странъ, къ С. и СЗ., онъ встрѣчается уже спорадически, преимущественно по сосновымъ борамъ, достигая до Петроградской губ. и средней Европы.

Экспедиціей полк. Козлова найдена въ сѣверо-восточномъ Тибетѣ слѣдующая разновидность:

var. *clarior* var. nova. (♂).

♂. Отличается отъ *subpilosa* свѣтлой окраской, почти такой-же какъ у *F. rufibarbis clara* For. Отъ послѣдней однако

---

6) A. FOREL, Notes sur quelques Formica. Ann. de la Soc. Entomol. d. Belgique. T. LVII, 1913, p. 360—361.