

съ темно-бурымъ налетомъ, съ коричневыми жилками и глазкомъ. Длина около 9 мм.

Муравей этотъ былъ найденъ на крайнемъ сѣверѣ Европейской Россіи (Архангельская губ., Лапландія, Мурманъ). Экспедиціей полк. Козлова взяты въ сѣверной и восточной частяхъ Тибета. Нахождение здѣсь этой формы свидѣтельствуетъ о спорадичности ея распространенія, — это интересный зоогеографическій фактъ, указывающій на сродство приполярныхъ областей нашего материка съ центрально-азиатскимъ нагорьемъ.

У нѣкоторыхъ экземпляровъ ♂♂ имѣется по одной щетинкѣ на нижней сторонѣ головы, что сближаетъ ихъ съ *Form. f. picea* var. *transcaucasica* Nass., у которой кромѣ указаннаго признака также иногда замѣчается (у ♀) и небольшая выемка на верхнемъ краѣ чешуйки. Кромѣ того, многіе экземпляры *gagatoides* (♂♂), наприм. изъ Нань-Шаня, отличаются менѣе блестящимъ брюшкомъ съ рѣдкими прилегающими волосками и съ столь-же рѣдкими наклонно-стоящими, сидящими преимущественно на его задней половинѣ. У ♂♂ изъ Восточнаго Цайдама бока pronotum и задніе углы головы, какъ и затылокъ, болѣе или менѣе блестящіе. Такимъ образомъ, очевидно, одни изъ экземпляровъ ♂♂ *gagatoides* представляютъ переходъ къ *F. fusca fusca*, другіе — къ *picea* и var. *transcaucasica*. Впрочемъ К. Эмери не признаетъ самостоятельность *F. transcaucasica* Nass. и считаетъ ее синонимомъ *F. picea* Nyl.¹⁰⁾

Мѣстонахожд.: 1) хырма Барунъ-цзасака, метеорологич. станція, восточ. Цайдамъ, IV. 1900 (♀ безр., ♂♂ — имѣются переходы къ *picea*); 2) хреб. Нань-Шань, Южно-Тэнтунгскія горы, нач. IX. 1901 (♂♂); 3) хреб. Нань-Шань, Чейбсенъ, Дангэръ-Кумъ, кон. VIII. 1901 (♂♂); 4) уроч. Тан-чюг-ги, на лѣвомъ берегу рѣки Ба-чю, 12000', Камъ, басс. р. Голубой, 2/3. VIII. 1900 (♂♂, ♂♂); 5) уроч. Улясенъ, ущелье Номохунъ, хреб. Бурханъ-Будда, басс. р. Желтой, 17. V. 1900 (♀, ♂); 6) вост. Цайдамъ, бивуакъ у хырмы Барунъ-цзасака, 14—18. V. 1900 (♂).

6. *Formica* (*Serviformica* For.) *fusca picea* Nyl. (♀, ♂).

Рис. 1.

Этотъ муравей, какъ оказывается, распространенъ широко въ Палеарктической области. Свойственъ преимущественно степямъ, каменистымъ мѣстамъ и горамъ, гдѣ поднимается до предѣловъ вѣчнаго снѣга. Въ Тибетѣ былъ найденъ Н. М.

10) С. Емелю, loc. cit., p. 195.