

7. *Formica (Serviformica) fusca* L. subsp. *orientalis*
subsp. nova.

Рис. 5 и 6.

F. fusca orientalis (♀) очень близка къ *gagates* и *picea*, составляя какъ бы промежуточную между ними форму. Заднеспинка закругленная, безъ замѣтнаго угла между покатой и основной ея поверхностями; но различіе состоитъ въ томъ, что покатая поверхность нѣсколько болѣе крутая и болѣе вогнутая тѣмъ у *gagates*. Тогожъ такой-же какъ у *picea*, т. е. сравнительно слабый и тонкій, тогда какъ у *gagates*, онъ является болѣе плотнымъ и крѣпкимъ. Окраска, опушеніе и структура поверхности тѣла какъ у *picea*, равно какъ и величина.

Самка особаго отличія не представляетъ.




Рис. 5. *Formica fusca orientalis*, ♀
(р. И-чю).




Рис. 6. *Form. fusca orientalis* (♀).
Цайдамъ. (Переходъ къ *piceo-orientalis*).

Это, повидимому, типичная средне-азиатская форма, выкарная по отношенію къ *F. gagates*, замѣняющая послѣдняго на востокѣ Палеарктической области. И подобно тому какъ въ юго-западной Европѣ существуютъ промежуточныя формы между *F. fusca* (s. str.) и *gagates*, описанныя А. Форелемъ какъ var. *fusco-gagates*, такъ и здѣсь, въ центральной Азій, имѣются въ коллекціи полковн. Козлова несомнѣнные переходы между *picea* и *orientalis*, образующіе var. *piceo-orientalis* n.

Var. *piceo-orientalis* var. nova.

Отличается (♀) строеніемъ заднеспинки, основная поверхность которой менѣе выпукла, но и не такая прямая какъ у *picea*, образуя слабо замѣтный уголъ съ покатой поверхностью.

По указаніямъ К. Эмери (на основаніи письменнаго сообщенія Майра, см. Emery, loc. cit. s. 194) въ альпійской области Кавказа встрѣчаются переходныя формы между *F. f. picea* и *gagates* (var. *piceo-gagates* n.).