

Мѣстонахожд.: 1) дол. р. Голубой (Янтъ-ээ), Камъ, восточн. Тибетъ, III. 1901 (♂♂); 2) дол. р. Голубой и въ смежныхъ ущельяхъ, послѣ второй переправы, на высотѣ 12.000', дневка по случаю обильнаго снѣга, 6. III. 1901, ♂ (Козловъ).

16. *Myrmica kozlovi* spec. nova. ♂.

Рис. 10 и 11.

♂. Голова короткая, закругленная сзади. Стебелекъ короткий приблизительно какъ у *M. sulcinodis*. Первый его узелокъ весьма укороченъ, съ короткой и толстой передней (стебельчатой) частью; его передняя покатая поверхность слабо вогнута, задняя выпукла; сверху онъ образуетъ закругленный уголь; второй узелокъ сверху выпуклый, приподнятый. Шипы заднеспинки сильно развиты; они большіе, широкіе при основаніи, загибающіеся назадъ, острые, слабо расходящіеся и концами иногда немного загнутые внутрь; основаніе ихъ покрыто мелкими продольными морщинками, верхняя заостренная половина совершенно гладкая. Лобная площадка гладкая и блестящая. Рукоять усиковъ при основаніи согнута какъ у *M. rugosa* Маур., т. е. изгибается постепенно, не образуя прямого угла и безъ лопасти; въ длину достигаетъ до затылка. Булава усиковъ 4-членниковая. Личной щитокъ выпуклый, съ переднимъ краемъ закругленнымъ, не выдающимся въ видѣ угла; онъ сверху покрытъ продольными неправильными морщинками, болѣе или менѣе блестящій, особенно въ его задней части, прилегающей къ лобной площадкѣ. Лобные валики небольшіе.

Скульптура тѣла грубая, крупная, какъ у *M. rugosa*. Голова на лбу покрыта продольными крупными морщинками; на остальныхъ частяхъ головы морщинки неправильны, бугристы.




Рис. 10. *Myrm. kozlovi*, ♂. Профиль заднеспинки и стебелька. (Долина рѣки Голубой).




Рис. 11. *Myrmica kozlovi* (♂). Усикъ: Funiculus и Scapus. (Басс. р. Голубой).