

17. *Myrm. kozlovi* subsp. *mekongi* sbsp. nova. (♀).

Рис. 12.

Отличается отъ типа болѣе свѣтлой окраской, болѣе слабой скульптурой и формой шиповъ.

♀. Грудь и стебелекъ красно-коричневые; брюшко коричневое, болѣе темное; голова и усики черновато-коричневые; ножки свѣтлѣе. Скульптура головы и торакса слабѣе: морщинки нѣсколько болѣе мелкія и на бокахъ передне-средне-спинки имѣютъ болѣе правильно выраженную продольность. Шипы заднеспинки короче, направлены косо-вверхъ и слабо изогнуты. Стебелекъ въ общемъ такой-же формы, какъ у *M. kozlovi*, только первый узелокъ немного длиннѣе и болѣе тупо сверху закругленъ. Вдавленіе между средне-задне-спинкой сильнѣе выражено. Длина тѣла какъ у *kozlovi*.




Рис. 12. *Myrm. kozlovi mekongi* (♀)
(р. Ба чю).

Найдена въ восточномъ Тибетѣ, въ верховьяхъ р. Меконга. Мѣстонахожд.: р. Бар-чю, басс. р. Меконга, Камъ, 12000', кон. IX. 1900 (♂♂), (Козловъ).

18. *Myrm. kozlovi* subsp. *subbrevispinosa* subsp. nova. (♂).

Рис. 13.

Отличается эта раса главнымъ образомъ короткими, болѣе толстыми шипами заднеспинки, направленными почти прямо назадъ.

♂. Шипы на заднеспинкѣ короткіе, почти вдвое короче чѣмъ у *kozlovi*, толстые, зубцевидные, направленные назадъ. Первый узелокъ стебелька короткій, имѣетъ форму тупозакругленнаго конуса. Окраска нѣсколько темнѣе, чѣмъ у *mekongi*. Скульптура ближе подходит къ *mekongi*. Дл. ок. 5 mm.



Рис. 13. *Myrm. kozlovi subbrevispinosa* (♂).

Въ коллекціи П. К. Козлова нашелся одинъ экземпляръ ♂ изъ восточнаго Тибета.

Мѣстонахожд.: дол. р. Голубой, Камъ, вост. Тибетъ, III. 1901 (♂), (Козловъ).