

*Myrm. kozlovi*, subsp. *subalpina* subsp. nova.

Рис. 14.

Эта оригинальная мирмика рѣзко отличается по формѣ шиповъ на заднеспинкѣ отъ *subbrevispinosa* и другихъ представителей *Myrm. kozlovi*. Можетъ быть даже заслуживаетъ значенія вида.



Рис. 14. *Myrm. kozlovi subbrevispinosa*, var. *subalpina*.

♀. Отличается главнымъ образомъ сильными, толстыми и широкими при основаніи шипами заднеспинки, длина коихъ больше, чѣмъ у *M. melkongi*. Они сильно изогнуты посрединѣ и затѣмъ направляются почти

прямо назадъ. Морщинистость головы и торакса, какъ у *M. subbrevispinosa*. Цвѣтъ нѣсколько темнѣе, чѣмъ у послѣдней. Остальное почти какъ у subsp. *subbrevispinosa*.

Мѣстонахожд.: дол. р. Голубой, Камъ, вост. Тибетъ, III. 1901 (♀), (Козловъ).

19. *Myrm. smythiesi* For. (♀).

Рис. 15.

Эта мирмика была описана А. Форелемъ съ Гималаевъ. Впослѣдствіи была найдена въ Туркестанѣ, на Алтаѣ и въ восточной Сибири.




Рис. 15. *Myrm. smythiesi* For. ♀. (Дза-чю, Камъ, басс. р. Голубой).

Мѣстонахожд.: 1) уроч. Тан-чюг-ги, на лѣв. берегу р. Ба-чю, 12.000', Камъ, басс. р. Голубой, 21. VIII. 1900 (♀); 2) р. Дза-чю, Камъ, басс. р. Голубой, IV. 1901 (♀), (Козловъ).

Var. *bactriana* var. nova. (♂, ♀).

Рис. 16, 17 и 18.

♀. Отличается болѣе темной окраской. Коричневая, грудь красновато-коричневая, голова сверху и брюшко черновато-коричневые. Шипы на заднеспинкѣ короче; они тонкіе, прямые, на концахъ не острые, а слегка закругленные. Первый узелокъ стебелька нѣсколько короче. Морщинистость тѣла, особенно