

на бокахъ головы, болѣе грубая (какъ у *Myrm. smythiesi dshungarica* Ruzsky). Величина тѣла больше, именно 4—4,5 mm.

♂. Голова полуматовая или лишь слабо блестящая, мелко-морщинистая; на бокахъ лба (между нимъ и глазами) мелкая и частая точчатость. Личной щитокъ гладкій и блестящій. Грудь блестящая или полублестящая, съ продольными штриховатыми



Рис. 16. *Myrm. smythiesi*, var. *bactriana* (♂).




Рис. 17. *Myrmica smyth.*, var. *bactriana*, ♀. (Голова).

морщинками; на бокахъ ея (на mesosternum и scapulae) морщинки весьма сглажены. Стебелекъ блестящій. Первый его узелокъ сверху закругленный и почти гладкій, съ едва замѣтными, очень мелкими штриховатыми морщинками; второй узелокъ вполне гладкій. Брюшко гладкое и блестящее. Задне-спинка съ тупо-угловатыми бугорками, гладкая и блестящая.

Рукоять усиковъ какъ у *M. levinodis* Nyl.; она очень слабо согнута при основаніи и дальше почти прямая, въ длину равна почти половинѣ жгутика (приблизительно 6-ти его первымъ членикамъ). Булава усиковъ 5-члениковая. Ножки и рукоять усиковъ съ полуприлегающими желтоватыми волосками, но безъ отстоящихъ.



Рис. 18. *Myrm. smythiesi*, var. *bactriana*, ♂. (Усикиъ).

Черновато-бурый, съ коричневатыми лапками и наружными половыми органами. Крылья съ коричневатымъ отѣнкомъ. Дл. 5—5,2 mm.

Самцы *M. smythiesi* до сихъ поръ не были извѣстны. Какъ очевидно изъ описанія, они ближе всего по формѣ рукояти усиковъ стоятъ къ *M. levinodis* и *ruginodis*.

Мѣстонахожд.: окр. уроч. Дариндо, дол. р. Дза-цю, Камъ, верховья р. Голубой (Янгъ-цзы), S. VIII. 1900 (♂♂, ♀♀), (Козловъ).