

Рис. 24. *Myrmica ruginodis*, var. *khamensis*, ♂. Рукоять усика.

Типичная *Myrm. ruginodis* очень обыкновенна въ лѣсахъ сѣв. и средней Европы, также большей части Сибири. Южная граница ея въ Азiи еще не высленена.

Описываемая форма ея — высокогорная (повид. альпійская); найдена въ сѣверномъ и восточномъ Тибетѣ, на выс. 11.400'.

Мѣстонахожд.: 1) с. Джерку, на бер. р. Цзан-да, Камъ, басс. р. Голубой, серед. VIII. 1900 (♂); 2) долина р. Тэтунга, сѣв.-вост. Тибетъ хреб. Нань-Шань, нач. IX. 1901 (♂), (Козловъ).

22. *Messor excursionis* Ruzsky²³), subsp. *alaschanicus* subsp. nova. (♂).

Рис. 25, 26 и 27.

♀. Голова болѣе или менѣе блестящая, съ болѣе мелкой и сглаженной скульптурой (особенно у крупныхъ ♀♀). Про-




Рис. 26. *Messor excurs. alaschanicus*, ♀. Funiculus.




Рис. 25. *Mess. excursionis alaschanicus*, ♂.

дольныя штриховатыя морщинки на головѣ болѣе рѣдкія, мелкія и мѣстами сильно сглаженныя; онѣ покрываютъ не всю поверхность головы, а только часть ея, причемъ затылокъ, задніе углы головы, пространство позади усиковыхъ ямокъ и продольная полоска на лбу остаются гладкими. Морщинки по краямъ усиковыхъ ямокъ очень слабо развиты. На поверхности головы, кромѣ того, раз-

23) Устанавливая эту форму изъ Закаспійской обл. и съ Балхаша, я первоначально принималъ ее за разновидность послѣдующаго вида (*Mess. lobulifer* Em.); но — это несомнѣнно самостоятельный видъ, какъ это впервые указалъ В. А. Караваевъ при описаніи муравьевъ Закаспійской области.