

# Матеріалы по мирмекологіи Сибири.

(Изъ Зоологическаго Кабинета ИМПЕРАТОРСКАГО Томскаго Университета, № 1-й).

Проф. М. Рузскаго.

*Output (issue) first*  
В ы п у с к ъ п е р в ы й.

*On the myrmecological fauna of Tomsk province and certain other*  
**О мирмекологической фаунѣ Томской губ. и нѣкоторыхъ другихъ мѣстностей Сибири.**

*sites of Siberia. (on Siberian localities).*

(По изслѣдованіямъ 1914--1915 г.г.).

(*From researches in 1914-1915*).

Лѣтомъ 1914 года я получилъ возможность, благодаря командировкѣ отъ медицинскаго факультета и совѣта Императорскаго томскаго университета, сдѣлать экскурсію въ предѣлахъ Кузнецкаго, Барнаульскаго и Бійскаго уѣздовъ Томской губ., также посѣтить и Сѣверный Алтай къ югу до ст. Мююты, по Чуйскому тракту, и отъ Чемала, на правой сторонѣ р. Катуня, до г. Бійска.

Во время этой поѣздки я могъ впервые ознакомиться съ общимъ характеромъ томской природы и отличительными особенностями ея фауны. Къ сожалѣнію участки равнинной лѣсостепи оказались сильно измѣненными и распаханными. Типичная степь, иногда съ каменистымъ характеромъ, развитая здѣсь на склонахъ, которые меня особенно привлекали, большей частью уже не имѣла своего типичнаго характера, будучи испорченной вслѣдствіе пастьбы скота. Лѣсовъ же хвойныхъ, хотя и они мѣстами значительно разрѣжены, сохранилось еще много — они, особенно къ востоку отъ р. Томи, въ южной части Кузнецкаго уѣзда, среди дикихъ горъ и на Салаирскомъ хребтѣ, не говоря уже про Алтай, всюду вполнѣ господствуютъ. Лѣса эти имѣютъ горно-таежный характеръ, носятъ названіе „черни“ и состоятъ въ общей своей массѣ, какъ и равнинно-сѣверная томская тайга, изъ пихты, ели, кедра, сосны и лиственницы, съ примѣсью березы и осины, образующихъ большія заросли, оживляющія въ значитель-