

щенко, проф. В. В. Сапожниковымъ, П. Н. Крыловымъ и др. Теперь, благодаря моей поѣздкѣ, удалось эти дан-значительно пополнить какъ въ отношеніи новыхъ мѣстонахожденій уже извѣстныхъ видовъ муравьевъ, такъ и относительно новыхъ формъ, до сихъ поръ не найденныхъ въ Томской губ.

Главные мои сборы производились въ слѣдующихъ мѣстностяхъ:

1) Въ Кузнецкомъ уѣздѣ—по берегу р. Томи, около нѣкоторыхъ паромныхъ пристаней, въ окрестностяхъ Кузнецка (долина р. Томи, д. Монастырь, с. Христорождественское и др.), на пути между Кузнецкомъ и Бійскомъ (Березовка, Томскій заводъ, Салаирскій кряжъ, Тогульское, Мартыново), на склонахъ р. Чумыша, на лѣсо-степныхъ лугахъ близъ Яминской и пр.

2) Въ Бійскомъ у.—въ окрестностяхъ Бійска, по правую и лѣвую сторону р. Оби, на пути между Бійскомъ, с. Сухой Чемровкой и Баланихой, между Бійскомъ и Верхне Катунской, у устья р. Катуня, пр. Усть-Чарышская и др.

3) Въ Барнаульскомъ у.—окр. г. Барнаула, ок. Камня и др.

4) Въ Томскомъ у.—въ окр. Томска (Басандайка, Городокъ, д. Бѣлобородова, Архимандритская заимка)

5) Въ Сѣверномъ Алтаѣ я наблюдалъ и собиралъ муравьевъ въ разныхъ пунктахъ между Бійскомъ и Муютой на пути къ Аносу, въ долину Катуня ок. Узнези, на склонахъ и вершинахъ горъ у Черги, далѣе по тракту на правой сторонѣ Катуня (ст. Бишбель-чиръ, Бируля, долина Бол. и Мал. Имери, Алаксандровское, луга р. Маймы, женскій монастырь, Майма, Усть-Иша и др. до Верхне-Катунскаго).

Подсем. *Camponotinae*.

Camponotus herculeanus L. (♀, ♂, ♀).

Кампонотусъ этотъ, какъ типичная лѣсная форма, очень обыкновененъ въ Томской губ. въ хвойныхъ и смѣшанныхъ лѣсахъ.

Гнѣздится въ пняхъ, отмершихъ стволахъ, также нерѣдко и при основаніи деревьевъ, въ землѣ между корнями.

Въ окрестностяхъ Томска были найдены зимующія крылатыя особи (♀ и ♂) въ лиственничномъ пнѣ, у д. Круглыхиной, І. Э. Гоганзенъ. Они были встрѣты съ рабочими въ состояніи