

Онъ встрѣчается гораздо чаще, чѣмъ *C. herculeanus* (typ). На Алтаѣ это одинъ изъ самыхъ обычныхъ его обитателей; но тамъ онъ представляетъ особую разновидность.

Крылатая формы (♀ ♀ и ♂ ♂) — въ маѣ и первой половинѣ юня.

Барнаульскій и Бійскій у.у. (найденъ мною и Лисицынымъ, главн. образомъ, въ борахъ, ок. Чингизы Спирино; въ Кузнецкомъ у., мною и Чугуновымъ ок. Кузедѣво; въ окр. Томска, мною въ Городкѣ, Архимандритской заимкѣ и др.

— var. *altaica* nov. (♀).

♀. Отличается отъ типичной формы болѣе частыми отстоящими волосками на верхней сторонѣ брюшка, гдѣ они имѣются не только по краямъ сегментовъ, но и по серединѣ ихъ, располагаясь между двумя этими краевыми рядами. Прилежающіе волоски на брюшкѣ болѣе короткіе и болѣе рѣдкіе.

Мѣстонахожденія: с. Черга, Муюта, дорога къ Аносу, склоны долины р. Катуня. На вершинахъ горъ и склонахъ, поросшихъ лѣсомъ (лиственница, сосна, береза) съ богатой травянистой растительностью.

На Алтаѣ встрѣчается и типичный *C. saxatilis*, но повидимому рѣдко (Чемаль) (!).

— var. *saxatile aterrimus* Ruzsky (♀, ♀).

Найдена эта форма въ Кузнецкомъ уѣздѣ въ Салаирскомъ хребтѣ (Томскій заводъ), ок. Кузедѣво, Тельбесскій рудникъ, Березовка, Алтай !. Образуетъ незамѣтные переходы съ типомъ.

### **Formica (Formica Ruz. s. str.) rufa L. (s. str.) ♀, ♂, ♀.**

Всюду обыкновененъ въ Томской губ., въ лѣсахъ. Крылатая особи найдены мною во второй половинѣ мая (окр. Томска).

Мѣстонахожденія: с. Богородское, Томскаго у. Г. Иоганзенъ; Кузнецкій у. !!, Березовка, Томскій заводъ, Тельбесскій рудникъ, Кузедѣво, Катунская гора; Алтай: Черга Муюта, Анось, Майна, Александровское, долина Катуня) (!!). Томскъ (!! (университетская роща, Монастырскій садъ), Городокъ (!! (крылат. ♀ ♀ и ♂ ♂ 17 и 26 мая). Басандайка, Архимандритская заимка (!! (♀ и ♂ 31 мая); дер. Большая Евтюшина (Ускова тожь), Томскій у., лѣсъ изъ ели, кедра и пихты (Б. Клопотовъ, 4 юля 1914 г.): с. Спирино, Барнаульскаго у., (Лисицынъ,