

4 июля 1914 г.). г. Томскъ, Парходная пристань, ♀ крыл. 8 мая 1915 (Ч у г у н о в ъ).

— var. *rufo-pratensis* For. (♀).

Нерѣдка въ южной половинѣ Томской губ. Мѣстонахожденія, окр. Томска (!); Кузнецкій у., окр. Кузнецка, д. Монастырь, Березовка, дол. Томи (!!); Бійскій у., Сух. Чемровка, окр. Бійска: Алтай, Черга, Верхне-Катунское (!!). Окр. г. Барнаула (!). На пути отъ Кузнецка къ Березовой попадался мнѣ довольно часто среди березово-пихтовыхъ лѣсовъ.

Formica rufa pratensis Retzius (♀, ♀, ♂).

Краснобурый волосистый муравей принадлежит южной и средней полосѣ Томской губ., гдѣ онъ живетъ на степныхъ лугахъ и среди березовой лѣсостепи. Попадаетъ и въ сосновыхъ борахъ. На типичныхъ степныхъ склонахъ и островкахъ между Тогульскимъ и Мартыновскимъ, также ок. Яминскаго, обыкновененъ, образуя здѣсь свои обычнаго типа гдѣзда, окруженныя землянымъ валомъ, заросшимъ травой. Крылатая самки здѣсь были найдены въ муравейникахъ 23 июня (!).

Найденъ мною также въ Барнаульскомъ у., въ Бійскомъ (долина Оби и склоны) и на Алтаѣ (Катунское, Бѣлокуриха !!). Часто попадался на дорогѣ отъ ст. Бишбель-Чирь въ Бирулю по опушкамъ и полянамъ березовыхъ и лиственнично-сосновыхъ лѣсовъ, и еще среди березовыхъ парковъ и на выгонѣ (поскотинѣ) между Сростками и Верхне-Катунскимъ.

Окрестности Томска (Архимандритская заимка !!, 2 августа 1914 г.; Городокъ, ! 26 мая); Кузнецкій у., (окр. Кузнецка, с. Христорождественское, Тельбесскій рудникъ, Кузедѣво, Тогульское, Мартыново, Яминское, Бійскій у. !! (окр. Бійска, Усть) Чарышская !!); Барнаульскій у., (окр. Барнаула, с. Туминское !!, Новониколаевскъ !; Томскій у., ок. д. Больш. Евтюшина (Ускова, въ елово-пихтово-кедровомъ лѣсу (Б. К л о п о т о в ъ, 5 июля 1914 г.); с. Спирино, Барнаульскаго у., на берегу р. Оби, сосновый боръ (Л и с и ц ы н ъ, 10 июля 1914 г.).

— var. *ciliata* nov. (♀, ♀).

♀. Отличается болѣею волосистостью и болѣе темной окраской. На *metanotum* по срединѣ сверху слабая выемка. Остальное какъ у типичной формы.