

♀. Тѣло сверху все (голова, грудь, брюшко) покрыто отстоящими волосками. На брюшкѣ они болѣе рѣдкіе и группируются на передней его половинѣ. Остальное какъ у типа. У типичной *Form. pratensis* ♀ безъ отстоящихъ волосковъ сверху или лишь съ очень рѣдкими разбросанно—сидящими волосками.

Мѣстонахожд.: на пути къ с. Яминскому, Кузнецкаго у., (крыл. ♀♀, 24 іюня, 1914 г. (!), небольшой ковыльно-типчаковый участокъ степи).

Оказывается, что эта разновидность встрѣчается и въ Европейской Россіи (имѣются въ моей коллекціи изъ Саратовской губ. и Воронежской, Хрѣновскій боръ); также на Кавказѣ. Объ этомъ я упоминалъ въ своей работѣ о муравьяхъ Россіи*).

— var. *truncicolo-pratensis* For. (♀).

Найдены были мною отдѣльные экземпляры въ окр. г. Кузнецка, на лугахъ среди кустарниковъ, ползавшіе по землѣ въ травѣ и на молодыхъ осинахъ (!!).

Алтай: на пути къ Сарасѣ, въ березовой рошѣ (!!).

Formica rufa truncicola Nyl. (♀, ♀).

Красный золотисто-волосый муравей въ предѣлахъ нашей губ. болѣе рѣдокъ, чѣмъ два предыдущіе его сородича. Онъ былъ найденъ мною въ окр. Томска (Архимандритская займка и Городокъ, сосновый боръ, но рѣдокъ тамъ) и даже въ самомъ городѣ, напр. въ университетскомъ саду, откуда, впрочемъ, онъ уже и раньше былъ извѣстенъ.

Въ Барнаульскомъ и Кузнецкомъ уѣздахъ повидимому приуроченъ къ лѣсостепнымъ районамъ (Мартыново, Барнаулъ), Бійскъ !!. Въ Сѣверномъ Алтайѣ былъ добытъ около ст. Комаръ (!).

— var. *yessensis* For. (♀) f. *interm.*

Нѣсколько экземпляровъ этой разновидности, описанной первоначально изъ Японіи, были пойманы мною въ долину р. Томи у Смолиной, Кузнецкаго уѣзда. Экземпляры не типичны, образующіе въ нѣкоторомъ отношеніи переходъ къ *truncicola* (typ.).

Была извѣстна уже изъ Сибири (Томская и Тобольская губ.).

*) См. М. Рузскаго, Муравьи Россіи, Т. I, стр. 337—38 (въ сноскѣ).