

стямъ, также участкамъ типичной и каменистой степи. Не рѣдокъ и въ борахъ.

Кралатыя ♀♀ и ♂♂ были находимы въ юнѣ и июлѣ, въ разное время, въ муравейникахъ. Мѣстонахожденіе: Томскій у., с. Богородское (П о к р о в с к а я), Бѣлобородово, окр. Томска !!; Басандайка (крыл. ♀♀, июля), Городокъ !; Кузнецкій у.: окр. Кузнецка, — Яминское ! (на травянистой степи); окр. Барнаула !; окр. Бійска !; Сух. Чемровка !!; Алтай !!; Мюта-Аносъ (склоны, каменистыя вершины горъ); Сростки—Верхне—Катунское (березовая лѣсостепь, поскотины); Алтайское !!.

— var. *rufomaculata* Ruzsky (♀).

Найденъ только однажды, на степномъ лугѣ, въ окр. Барнаула !.

— var. *exsecto pressilabris* For. (♀).

Переходныя формы между *F. exsecta* и *pressilabris* попадались мнѣ не часто, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, среди смѣшанныхъ лѣсовъ, въ Томской г. (ок. Томска, Кузнецкій у., Алтай: ок. Черги, Бишбель-Чира и др.).

Formica (Serviformica For.) fusca L. s. str. (♀, ♂, ♂).

Чернобурый лѣсной муравей въ Томской губ. обыкновененъ всюду въ лѣсахъ, хвойныхъ и лиственныхъ, въ равнинѣ, на горахъ и въ рѣчныхъ долинахъ. Гнѣздится наичаще въ пняхъ, рѣже въ землѣ подъ камнями, упавшими кусками дерева или коры (чаще начинающіяся гнѣзда) и еще рѣже, строить небольшіе земляные холмики.

Крылатая половая особи наблюдались мною въ концѣ юня (Алтай), въ июлѣ и первой половинѣ августа (окр. Томска).

Въ качествѣ рабовъ живетъ въ муравейникахъ кроваваго муравья (*Formica sanguinea* Ltr.).

Мѣстонахожденія: окр. Томска !! (Басандайка, Городокъ, Бѣлобородова, сады и парки въ городѣ); Кузнецкій у. !! (окр. Кузнецка, долина р. Томи, Березовая-Томскій заводъ !!, Салаирскій хребетъ !!, Тогульская, !; Кузедѣво, Тельбесскій рудникъ, Катунская гора (Ч у г у н о в ь); окр. Бійска; Буланиха; Алтай !!: (Черга, Мюта, Аносъ, Чемаль, Бишбиль-Чирь, Сростки—Верхне-Катунское и др.); въ Барнаульскомъ у., мною найдены въ окрестностяхъ Барнаула;