

студ. Ли си цы н ы м ъ—ок. Спирино, въ сосновомъ бору на берегу р. Оби (15 іюля 1914 г.).

— var. *glebaria* Nyl. (♂, ♀).

Столь-же обыкновененъ, какъ и *F. fusca* s. str. и также свойственъ лѣсамъ. Находимъ былъ мной въ окрестностяхъ Томска и Кузнецка, въ лѣсахъ Кузнецкаго уѣзда, на Салаирскомъ кряжѣ, въ Сѣверномъ Алтаѣ (Черга, Узнезя, долина Катуня).

Крылатая самка найдены въ муравейникѣ въ концѣ іюня, ок. Томскаго завода.

— var. *rubescens* For. ♀.

Эта разновидность впервые констатируется для Сибири.

Найдена мною въ окр. г. Кузнецка, на небольшомъ склонѣ къ долиноѣ р. Томи, въ маленькомъ земляномъ муравейникѣ при основаніи березоваго пня; затѣмъ на пути въ Тогульскую (березовая лѣсостепь, въ іюнѣ). На берегу Оби взяты ♀♀ въ сосновомъ бору, ок. с. Спириной. Томск губ., Барнаульскаго у. (ст. Ли си цы н ъ, 4 іюля 1914 г.).

Въ Европейской Россіи распространеніе этой разновидности совершенно почти не извѣстно. Найдена мной за послѣдніе годы въ Казани (Арское поле, ок. кладбища, 30 іюня 1909 г.).

### **Formica (Serviformica) fusca picea** Nyl. ♀

Былъ встрѣченъ мною въ Барнаульскомъ и Бійскомъ уѣздахъ на степныхъ и каменистыхъ мѣстахъ. Между Тогульской и Мартыновой обыкновененъ на степныхъ склонахъ, поросшихъ *Festuca*, ковылемъ и др. рѣдко-растущими растеніями. Въ окр. Кузнецка я также нашелъ нѣсколько рабочихъ ползавшихъ по землѣ, среди мелкихъ камней, на склонѣ горы, у с. Христорожественскаго.

На Алтаѣ попадался нѣрѣдко ок. Черги, Мюкты, Алтайской и Верхне-Катунской. Гнѣздится въ норахъ, въ землѣ или подъ камнями. Сѣверная граница распространенія этого вида въ Томской губ. пока не опредѣлена.

### **Formica (Serviformica) For.) rufibarbis** Fabr. ♀, ♂, ♀.

Обыкновенна въ Томской губ. и на Алтаѣ, живетъ въ степяхъ въ сосновыхъ борахъ, въ березовыхъ паркахъ. На песчаныхъ или каменистыхъ берегахъ рѣкъ (Оби, Томи, Катуня и др.)