

тоже не рѣдка. Въ Алтайскихъ горахъ держится на безлѣсныхъ или малолѣсистыхъ склонахъ и вершинахъ горъ. Крылатая ♀, ♂ !! въ концѣ іюня и въ іюлѣ.

Мѣстонахожденія: окр. Томска !! (Басандайка, Городокъ, на пескахъ и въ борахъ); Кузнецкій, Барнаульскій и Бійскій уу., на лѣсо-степн. участкахъ, на степныхъ склонахъ, также и въ борахъ (крылатая формы найдены мною въ первой половинѣ іюля); Алтай !! (по дорогѣ изъ Сростки въ Верхне-Катунское ♂♂, 30 іюня); с. Бишбель-Чиръ: Черга, Мухота, Катунское и др.); Кузнецкій у. !! с. Тогульское, Мартыново, окр. Кузнецка, берега Томи; между Кузнецкомъ и Березовой, на лугахъ среди березъ !!; Яминская, степь !!; Кузедѣво, берегъ Кондомы и на покотинѣ (Ч у г у н о в ъ, 2 іюня); Барнаульскій у., окр. Барнаула !; с. Спирино, сосновый боръ на р. Оби, крылат. ♀ и ♂ 10 и 23 іюля (Л и с и ц ы н ъ).

— var. *glauca* Ruz. (♀).

Мѣстонахождение: на пути между с. Сух. Чемровкой и г. Бійскомъ на небольшомъ участкѣ солонцеватой степи, отдѣльн. экзempl. (!).

Раньше извѣстна была изъ Тобольской губ. и Акмолинской области.

— var. *katuniensis* nov. (♀).

♀. Отличается слабымъ поперечнымъ вдавленіемъ на metapodium. На тораксѣ, по бокамъ, и на верху чешуйки темноватая пятна. Остальное какъ у типичной формы.

Мѣстонахождение: по дорогѣ изъ Сростковъ въ Верхне-Катунское, среди березовыхъ луговъ съ невысокой, мелкой травой (выгонъ) со множествомъ пней, небольшой муравейникъ подъ камнемъ (!).

### Form. (*Serviformica*) *rufib. subpilosa* Ruz. (♀).

Эта раса найдена мною въ окр. Томска, около Басандайки, отдѣльными экземплярами, сбѣгавшими по песчаному склону къ р. Томи. Среди 'пойманныхъ' ♀♀ преобладали переходныя формы къ типичной *V. rufibarbis*.

— *subpiloso-rufibarbis* Ruz. (♀).

Мѣстонахожденія: окр. Томска: Басандайка, Городокъ, сосновый боръ (!); на пути отъ Кузнецка къ Березовой, луга среди рѣдкихъ зарослей березы, іюнь (!); Кузнецкій у., Кузедѣво, на