

поскотинѣ, 2 іюня (Чугуновѣ); Каинскій у., ауль Аялуцкій (Отрѣченской), березовый колокъ, среди подсолонковъ, 5 октября (Клопотовѣ).

**Form. (*Serviformica*) *rufib. clara* For. (♀).**

Одинъ экземпляръ ♀ этой, по преимуществу свойственной центральной Азіи. Западной Сибири и Кавказу формы, найденъ мной ок. Муюты, на участкѣ каменистой степи, у вершины небольшого хребта около выхода скаль.

**Form. (*Serviformica*) *cinerea* Mayr. (♀).**

Эта рѣдкая для Сибири формика найдена мной въ окрестностяхъ г. Бійска, въ долинѣ р. Оси, на песчаной почвѣ, ея обыкновенной станціи. Гнѣздилась въ норахъ, въ пескѣ.

Раньше извѣстна была изъ окр. Барнаула.

**Form. (*Raptiformica* For.) *sanguinea* Ltr. (♀, ♂).**

Кровавый рабовладѣльческій муравей широко распространенъ во всей палеарктикѣ кромѣ крайняго сѣвера и юга ея. Въ Сибири онъ идетъ до бассейна р. Амура. Крайняя восточная граница его распространенія еще не опредѣлена. О распространеніи его въ Томской губ. очень мало извѣстно: онъ былъ найденъ только въ одномъ пунктѣ ея (ст. Татарская).

Я наблюдалъ этого муравья въ Сѣв. Алтаѣ въ березовыхъ колкахъ ок. Верхне-Катунскаго гнѣздящимся въ пняхъ вмѣстѣ съ *Form. fusca* (раба). Въ Кузнецкомъ у. онъ повидимому довольно обыкновененъ, такъ какъ найденъ мной въ трехъ пунктахъ (окр. Кузнецка, на пути отъ Кузнецка въ Березовую и ок. Томскаго завода), а г. Чугуновымъ—ок. Кузедѣева и въ Тельбесскомъ рудникѣ, на Катунь-горѣ. Здѣсь онъ живетъ въ березовыхъ лѣсахъ, также на полянахъ и опушкахъ тайги. Въ качествѣ рабовъ держитъ *F. fusca*, рѣже *F. rufibarbis*. Затѣмъ былъ встрѣченъ мной въ окр. Барнаула.

Около г. Томска до сихъ поръ мнѣ не попадался.