

Изменчивость (рабочие): ДГ=0,73—0,75, ШГ=0,53—0,55, ДС=0,5—0,51, ДМ=0,98—1,08, ДП+ДПп=0,58—0,62 мм. Незначительно отличаются длиной шипа на постпетиоле.

**Дифференциальный диагноз.** От видов группы *kutteri* (*kutteri*, *tramieri*, *brunneus*) отличается наличием отстоящих волосков на средних и задних голених, от прочих видов самки отличаются длинным шипом снизу постпетиоля; рабочие отличаются: от *Ch. siciliensis* наличием явственного мезопроподолеального вдавления, от *insubricus* — более узким постпетиолем (сверху); от *muellerianus* (к которому весьма близок) — более сглаженной скульптурой груди, менее уплощенной среднеспинкой, слегка суженной в профиль чешуйкой петиоля.

Найден в лесу, в упавшей ветви дуба пушистого (*Quercus pubescens* Willd.), в гнезде *Leptothorax unifasciatus tauricus* Ruzs.

*Chalepoxenus zabelini* A. Radtschenko, sp. n.

Материал. Голотип, ♀, Зап. Копетдаг, п. Джеджирс, 20.06.1985 (С. Забелин); паратип ♂, там же. Хранятся в коллекции Зоологического музея Московского университета.

**Самка** (рис. 1, д, е). Голова прямоугольная (ИГ=1,3), немного расширена кзади, с закругленными задними углами и прямым затылочным краем. Глаза крупные (ИГл=3,45). Лобные валики прямые, почти доходят до линии, соединяющей задние края глаз. Скапус достигает затылочного края. Скульптура головы — как у *Ch. tauricus*.

Грудь относительно высокая (ИМ=1,74), среднеспинка в профиль слегка выпуклая. Шипы проподоума удлиненно-треугольные. Боковые части груди слабо блестящие, в продольных морщинках, более грубых на проподоуме. Скутум и скутеллюм гладкие и блестящие.

Петиоль с развитой цилиндрической частью, толстой чешуйкой и широкотреугольным отростком снизу. Постпетиоль снизу с острым коротким зубчиком, в 1,59 раза шире петиоля. Оба членика стебелька и брюшко блестящие, с тонкой поверхностной скульптурой.

Опушение тела — как у *Ch. tauricus*, отстоящие волоски на голених и скапусе длинные и многочисленные.

Цвет охристо-желтый, брюшко коричневое. Размеры: ДГ=0,95, ШГ=0,73, ДС=0,73; ДМ=1,48, ДП+ДПп=0,8.

**Самец** (рис. 1, ж, з). Голова удлиненная (ИГ=1,55), с широко закругленными задними углами и выпуклым затылочным краем. Глаза очень крупные (ИГл=2,67). Лобные валики слегка расходящиеся назад, достигают линии, соединяющей задние края глаз. Скапус прямой, выходит за затылочный край на 1—1,5 своих поперечника; длина отстоящих волосков на скапусе немного меньше его поперечника.

Голова слабо блестящая, с явственными, но немногочисленными продольными морщинками, промежутки между которыми покрыты негустой пунктировкой.

Грудь высокая (ИМ=1,49), среднеспинка в профиль выпуклая. Проподоум с короткими тупыми буграми. Грудь блестящая, с очень слабой поверхностной скульптурой. Петиоль с короткой цилиндрической частью, чешуйка широко закруглена на вершине; постпетиоль в профиль полу-сферический. Выступ снизу петиоля маленький, широкотреугольный, на постпетиоле — в виде короткого острого шипика. Оба членика стебелька и брюшко с очень тонкой поверхностной скульптурой.

Отстоящие волоски на теле, в том числе и на голове, длинные, менее обильные, чем у самки. Средние и задние голени с многочисленными отстоящими волосками, длина которых примерно равна максимальной ширине голених.

Цвет как у самки. Размеры: ДГ=0,6, ШГ=0,39, ДС=0,5, ДМ=0,65, ДП+ДПп=0,48.