

Strongylognathus arnoldii Radtschenko, 1985
(рис. 2, г, е)

arnoldii Радченко, 1985:1514–1516, рис. 1 (*Strongylognathus*, 99δ, Гурзуф, Южный берег Крыма, типы в Зоологическом музее МГУ и Институте зоологии АН УССР).

Вид известен из Крыма. Близок к *S. rehbinderi* и *S. bulgaricus*, являясь своеобразным промежуточным звеном между ними. Найден в гнездах *T. caespitum*.

Strongylognathus cheliferus Radtschenko, 1985
(рис. 2, в, и)

cheliferus Радченко, 1985:1516–1517, рис. 2 (*Strongylognathus*, 9δ, УССР, Херсонская обл., Аскания-Нова, типы в Институте зоологии АН УССР и Зоологическом музее МГУ).

Известен из типового местонахождения. Найден в гнездах *T. caespitum* и *T. forte* в степи. Близок к *S. christophi*, отличается своеобразным строением гениталий самцов.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА МУРАВЬЕВ РОДА
STRONGYLOGNATHUS MAYR ФАУНЫ СССР

- 1 (4). Голова рабочих и самок с глубокой выемкой на затылочном крае, задние углы оттянуты назад (рис. 2, а); задние углы головы самцов (см. в профиль) вытянуты в виде закругленных лопастей (рис. 2, б)
 - 2 (3). Скульптура головы рабочих и самок сложенная, самое большое могут быть штриховатые поверхности морщинки на лбу и щеках; у самцов верх и бока груди с сильно сложенной скульптурой . . . *S. karawajewi* Pisarski
 - 3 (2). Голова рабочих и самок с грубыми продольными морщинками; бока груди самцов хотя бы частично с морщинками и грубой шагреневой скульптурой. *S. testaceus* (Schenck)
- 4 (1). Затылочный край головы рабочих и самок прямой или лишь слегка вогнутый (рис. 1, а, г; 2, г, д); задние углы у всех каст не оттянуты назад (рис. 2, в)
- 5 (6). Самки и самцы мелкие (ДМ ♀ не более 1,11 мм, ДМ ♂ не более 1,65 мм); вольсепла гениталий самцов без выемки перед очень маленьким апикальным зубцом (рис. 1, е); на боках груди рабочих густая шагреневая скульптура, морщинки совершенно не развиты *S. minutus* sp.n.
- 6 (5). Самки и самцы крупнее (ДМ ♀ не менее 1,65 мм, ДМ ♂ не менее 1,8 мм); строение вольсепла гениталий самцов иное (рис. 1, и; 2, е, ж), если сходное, то ДМ не менее 2,2 мм. На боках груди рабочих имеются по крайней мере короткие морщинки.
- 7 (14). Самцы
 - 8 (9). Стипесы гениталий с резкой перетяжкой в основной трети, сильно искривлены, загнуты концами внутрь (рис. 2, и) *S. cheliferus* Radtschenko
 - 9 (8). Стипесы гениталий с нерезкой перетяжкой в основной трети или без нее, слабо искривлены (рис. 2, з)
- 10 (11). Вольсепла гениталий с очень слабой выемкой перед небольшим апикальным зубцом (рис. 2, е); крупнее: ДМ не менее 2,2 мм. . . . *S. arnoldii* Radtschenko
- 11 (10). Вольсепла гениталий с глубокой выемкой перед апикальным зубцом (рис. 2, ж); мельче: ДМ не более 2,05 мм
- 12 (13). Голова с зернистой скульптурой, морщинистость неразвита *S. rehbinderi* Forel
- 13 (12). Голова с явственными морщинками и зернистой скульптурой между ними *S. christophi* Emery
- 14 (7). Рабочие и самки²

² Рабочие *S. cheliferus* неизвестны.