

1. Группа *T. striativentre* — у самок и рабочих I тергит брюшка в густой струйчатой скульптуре: *striativentre*, *schneideri*, *kabulistanicum*.

2. Группа *T. karakalense* — у самок и рабочих брюшко гладкое, но у его основания есть четкие веерообразно расходящиеся морщинки: в группе один вид.

3. Группа *T. caespitum* — отличаются широким и выпуклым скутумом самок, в профиль нависающим над пронотумом; углы пронотума сверху не видны: *caespitum* и, скорее всего, *jacoti*.

4. Группа *T. semilaeve* — самки с плоским скутумом, не нависающим сверху над пронотумом; углы пронотума видны сверху. Голова и грудь рабочих морщинистые: *semilaeve*, *forte*, *turcomanicum*, *reticuligerum*.

5. Группа *T. inerme* — самки по форме груди сходны с видами предыдущей группы, однако голова и грудь рабочих, по крайней мере сверху, гладкие и блестящие, либо с очень слабой поверхностной скульптурой: *inerme*, *armatum*, *nitidissimum*, *conconviceps*, *kisilkumense*, *vernicosus*.

6. Группа *T. ferox* — самки с очень характерными сильно расширенными члениками стебелька и гладкими мандибулами: *ferox*, *aegea*, *perspicax*, *densopilosus*, *confinis*: к этой же группе, по-видимому, относится и *bursakovi*.

Примеры и индексы: *ДГ* — длина головы строго спереди от затылочного края до края наличника; если затылочный край вогнут — от линии, соединяющей задние углы; *ШГ* — максимальная ширина головы спереди; *ДГл* — наибольший диаметр глаза; *ДС* — длина скапуса; *ДМ* — длина груди сбоку по диагонали от места сочленения с головой (у рабочих) или от передне-верхнего края мезонотума (самки, самцы) до конца эпистеральных лопастей; *ВМ* — высота груди сбоку от нижней точки мезоплевр перпендикулярно до верха мезонотума; *ШП* — ширина узелка петиоля сверху; *ШПП* — то же постпетиоля.

В первой части работы приведены описание новых видов и определительная таблица *Tetramorium* фауны СССР, во второй — систематический обзор.

Tetramorium vernicosus Radtschenko, sp.n.

М а т е р и а л: самка (голотип), Гиссарский хребет Кондара, 21.VI 1973 (В. Янушев); паратипы: ♀, Репетек, юго-восточные Каракумы, 19.V 1982 (Кривоухатский); 5 ♀♀, Киргизия, Аксу-Джабаглы, 1300 м над ур. м., 20.VI 1961 (Г. Длусский); 10 ♀♀, Узбекистан, северо-западнее Ишкента, 1500–1700 м над ур. м., 3.V 1942 (К. Арнольди); 10 ♀♀, Южный Узбекистан, Варганза, № 78–137, 30.V 1978 (Г. Длусский); 7 рабочих, Узбекистан, Кашка-Дарья, 26.V 1942 (К. Арнольди). Типы хранятся в ЗМ МГУ и ИЗ АН Украины.

О п и с а н и е. Самка (рис. 1, а, б).

Голова поперечная (*ИГ*-0,95–0,96), с параллельными боковыми сторонами и слегка вогнутым затылочным краем. Лоб с многочисленными тонкими морщинками, щеки и виски с штриховатой морщинистостью. Скапус не достигает затылочного края (*ИС*-1,22–1,24).

Скутум гладкий и блестящий; скутеллюм гладкий (голотип) или с тонкой поверхностной морщинистостью (паратип); проподеум сверху с нежными морщинками. Бока груди со слабыми, короткими морщинками. Проподеум с короткими, острыми треугольными зубчиками.

Членики стебелька не расширенные (*ИП*-2,2–2,8; *ИПП*-1,8–2,1), чешуйка петиоля уплощена, в профиль клиновидная.

Отстоящие волоски имеются на лбу, наличнике, темени, по бокам и снизу головы, на скутуме, скутеллюме, члениках стебелька и на всей поверхности тергитов брюшка.

Тело ярко-рыжее, блестящее.

Размеры: *ДГ*-1,09, *ШГ*-1,15–1,13 (1,15), *ДС*-0,88–0,9 (0,9), *ДМ*-1,99–2,06 (2,06) мм (в скобках — голотип).

Р а б о ч и е (рис. 1, в, г).